

Triteleia

čeleď: Alliaceae

Druhové jméno je složenina řeckých slov tria = tři a teleios = dokonalý. Pochází ze západu Severní Ameriky, od Britské Kolumbie až po Guatemalu. Patří mezi trvalky. Podobá se rodu Brodiaea a občas se tam i řadí. Taxonomie tohoto druhu je trochu problematická. Kvete až po odumření 1 - 3 úzkých řemenovitých, mečovitých nebo kýlnatých listů širokých 4 - 8cm vyrůstající z cibulovité hlízy. Květy bývají dlouze stopkaté, hvězdčité, 3četné a korunní lístky jsou na bázi srostlé v trubku. Plodem je tobolka. Nejznámějším druhem je asi T. laxa.

Vyhovuje ji plné slunce nebo mírný polostín, dostatek vody, půdu bohatou na živiny, záhy zatahují, potřebují sucho a teploty nad 20°C. U nás nejsou plně mrazuvzdorné.

Množí se semeny nebo dceřinými hlízkami, které vysazujeme do hloubky 6 - 8cm, nejlépe podložené písčitou vrstvou.

Triteleia bridgesii

oblasti: Kalifornie, Oregon

Triteleia clementina

oblasti: Kalifornie

Triteleia crocea

oblasti: Kalifornie, Oregon

Kvete žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. crocea

- var. modesta

Triteleia dudleyi

oblasti: Kalifornie

Triteleia grandiflora

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. grandiflora
- var. howellii

Triteleia guadalupensis

oblasti: Karibik

Triteleia hendersonii

oblasti: Kalifornie, Oregon

Dorůstá výšky 30cm. Kvete žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. hendersonii
- var. leachiae

Triteleia hyacinthina

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA a Kanadě. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Květenstvím je okolík, vlastní květy jsou dlouze stopkaté, miskovité, zpravidla bílé (i nařezané, modré nebo růžovořezané), mají krátkou trubku a korunní lístky jasně patrné centrální žebro.

Vyhovují ji vlhké louky, okraje potoků a lesů.

Triteleia ixioides

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA. Dorůstá výšky 10 - 80cm. Listy jsou čárkovité. Stonek může být na bázi drsný. Květenství je kulovité, vlastní květy dlouze stopkaté, žluté až bílé (i růžovořezané), uprostřed s tmavším proužkem a mají krátkou trubku. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. anilina - výška 10 - 25cm; vlhké kameny
- subsp. cookii - pobřeží Kalifornie; výška 20 - 25cm; korunní lístky s nápadným tmavým proužkem a zpětně stočené
- subsp. ixioides - Kalifornie; písčité půdy v dubových nebo borových lesích
- subsp. scabra - výška 20 - 50cm; stonek drsný; květy s nápadným tmavým pruhem uprostřed
- 'Starlight'
- 'Splendens' - dorůstá výšky 30cm, kvete žlutými květy

- subsp. unifolia - výška 10 - 30cm; zpravidla 1 úzce čárkovitý list

Triteleia laxa

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází z USA. Dorůstá výšky (10 -) 40 - 60 (i 70)cm. Stonek může být na bázi drsný. Listy jsou řemenovité. Kvete v řídkém okolíku, vlastní květy jsou nálevkovité s delší trubkou, žluté, modré (i bílé nebo růžovofialové). Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Corina' - květy světle růžovofialové
- 'Humbolt Star' - květy modré
- 'Königin Fabiola' - výška 50cm; květy fialové
- 'Queen Fabiola' - květy modré
- 'Rudy Kleiner' - květy světlemodré s tmavšími proužky
- 'Sierra Giant' - květy světlorůžové

Vyhovuje ji plné slunce i polostín a vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny. Je mrazuvzdorná.

Triteleia lemmoniae

oblasti: Arizona

Triteleia lilacina

synonyma: T. lilacinum

oblasti: Kalifornie

Triteleia lugens

oblasti: Kalifornie

Triteleia montana

oblasti: Kalifornie

Triteleia peduncularis

oblasti: Kalifornie

Triteleia unifolia

Triteleia x versicolor

oblasti: Kalifornie

Kříženec *T. hyacinthina* x *T. ixioides*.

Další informace:

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/triteleia-laxa>

<http://www.abecedazahrady.cz/default.aspx?server=1&catalog=1&catitem=671>

<https://www.rostliny.net/>