

Neuwiedia

čeleď: Orchidaceae

Patří mezi primitivní orchideje. Povrch rostliny je ochlupený. Nevytváří žádné oddenky. Stonek bývá vystoupavý až vzpřímený. Listy vyrůstají zpravidla ve spirále, jsou tenké, podélně žebrované a tvaru dlouze obvejčitého nebo kopinatého. Květenství je nevětvené, vzpřímené nebo převislé, terminální, hroznovité a tvoří je zpravidla bílé nebo žluté květy. Plodem je tobolka.

Spodní část stonku postupně odumírá a terestrická rostlina postupně přestává mít kontakt se zemí. Pěstování v kultuře je možné pouze u některých druhů a to s velkými potížemi.

Neuwiedia annamensis

Neuwiedia borneensis

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Neuwiedia elongata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Neuwiedia griffithii

oblasti: Malajsie, Sumatra, Vietnam

Roste ve Vietnamu, Malajsii a Sumatře.

Neuwiedia inae

oblasti: Borneo, Vietnam

Roste na Borneu a ve Vietnamu.

Neuwiedia malipoensis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně.

Neuwiedia siamensis

oblasti: Thajsko

Neuwiedia singaporeana

synonyma: *N. balansae*, *N. curtisii*, *N. ochracea*, *N. zollingeri* var. *balansae*, *N. zollingeri* var. *singaporeana*, *Tupistra singaporeana*

oblasti: Malesie

Neuwiedia veratrifolia

synonyma: *N. amboinensis*, *N. calanthoides*, *N. cucullata*, *N. lindleyi*

oblasti: Filipíny, Indonésie, Malajsie, Melanésie, Nová Guinea, Tichý oceán

Roste v Indonésii, Malajsii, Filipínách, Nové Guineji, Vanuatu a Šalamounových ostrovech.

Neuwiedia zollingeri

oblasti: Bali, Borneo, Hainan, Jáva, Malajsie, Sumatra, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *annamensis* - Vietnam
- var. *javanica*/*N. javanica* - Vietnam, Borneo, Sumatra, Jáva, Bali; tobolky jsou dužnaté a jedlé
- var. *singaporeana* - Hainan, Hong-Kong, Yunnana, Thajsko, Vietnam, Borneo, Sumatra, Malajsie
- var. *zollingeri* - Sumatra, Jáva

<https://www.rostliny.net/>