

Cladium (Mařice)

čeleď: Cyperaceae

V taxonomii panují velké rozpory. Podle různého pojetí existuje 2 - 60 druhů. Patří mezi byliny. Pochází z tropů a teplých oblastí celé zeměkoule. Dorůstá výšky 1 - 3m. Patří mezi jednodomé rostliny s obvykle oboupohlavnými květy. Listy mají čárkovitý tvar a podélnou žilnatinu. Kvete v kláscích.

Cladium californicum

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, S Mexiko, Utah

Pochází z jihozápadu Severní Ameriky a severního Mexika. Patří mezi trvalky. Roste na vzpřímeném až 2m stonku. Listy jsou úzké, ploché, na kraji s drobnými zoubky. Kvete ve velkém klasu a vytváří oválné červenohnědé plody - nažky.

Cladium chinense

oblasti: Čína

Pochází z východní Asie.

Cladium colocasia

Cladium jamaicense

oblasti: Jamajka

Pochází z tropů Ameriky. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. jamaicense

Cladium mariscoides

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Střední Amerika, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin

Roste v teplých oblastech Ameriky jako trvalka.

Cladium mariscus (Mařice pilovitá)

oblasti: Afrika, Andalusie, Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, Pákistán,

Polsko, Švýcarsko

Pochází z Evropy, Asie a Afriky. Dorůstá výšky (0,5 -) 0,8 - 2 (i 2,5)m. Pod povrchem vytváří výběžkatý oddenek. Stonek má drutý 3hranný průřez, průměr až 6mm a více než 10 článků. Listy vyrůstají ve spirále, jsou čárkovité, kýlnaté, ostře pilovité, dlouhé často i více než 50cm, široké 5 - 9mm a přízemní jsou pochvaté. Kvete v dlouhém lichoklasu délky 2,5 - 10cm, sekundárně větve jsou dlouhé do 3,5cm se svazečky 3 - 10ti klásků o délce 3 - 4mm, 2 - 4 spodní plevy jsou sterilní. Plodem jsou červenohnědé nažky.

Vyhovují ji mokřady nebo podmáčené půdy a vápnité slatiny. Je odolná vůči proměnlivé výšce hladiny.

Cladium nipponense

oblasti: Japonsko

Pochází z východní Asie.

Cladium procerum

oblasti: Austrálie

Pochází z Austrálie.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/cladium-mariscus/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Cladium>

<https://www.rostliny.net/>