

Hydrocotyle (Pupečník)

čeleď: Araliaceae

Roste především v teplých tropických oblastech jako zpravidla plazivá trvalka žijící na dunách až mokřadech, na mořském pobřeží anebo i v alpínském stupni. Listy jsou okrouhlé, vroubkované až dlanitě laločnaté, na bázi srdčité. Kvete drobnými květy.

Hodí se jako půdokryvná rostlina a také pro zpevňování půdy.

Množí se semeny nebo dělením.

Hydrocotyle aconitifolia

Hydrocotyle acuminata

synonyma: H. eccentrica

Hydrocotyle acutifolia

synonyma: H. cardiophylla, Spananthe sinuata

Hydrocotyle alchemilloides

synonyma: H. chamaemorus var. citriodora, H. geranioides

Hydrocotyle americana

synonyma: H. nitens

oblasti: Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Hydrocotyle aristeguietae

Hydrocotyle batrachium

synonyma: H. formosana, H. rotundifolium var. batrachium, H. sibthorpioides var. batrachium

Hydrocotyle benguetensis

synonyma: H. ranunculifolia

Hydrocotyle boliviensis

synonyma: H. acuminata var. boliviensis

Hydrocotyle bonariensis

synonyma: H. bonariensis var. multiflora, H. bonariensis var. texana, H. multiflora, H. polystachya var. quinqueradiata, H. tribotrys, H. umbellata var. bonariensis, H. verticillata var. bonariensis, H. yucatanensis

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Portoriko, Severní Karolína, Texas, Virginie

Roste v Jižní Americe jako trvalka. Stonek dorůstá délky až 30cm. Listy jsou prakticky kulaté, vroubkované, kožovité a tuhé. Květenstvím je bohatý složený okolík, vlastní květy jsou bílé nebo krémově žluté.

Vyhovují mu pobřežní písčité duny.

Hydrocotyle bonplandii

synonyma: H. bonplandii var. glabra

Hydrocotyle bowlesiaoides

oblasti: Georgia, Havajské ostrovy

Hydrocotyle burmanica

Hydrocotyle calcicola

Hydrocotyle chamaemorus

synonyma: H. araucana var. patagonica, H. chamaemorus var. valdiviana, H. valdiviana

Hydrocotyle confusa

Hydrocotyle cryptocarpa

Hydrocotyle dahlgrenii

Hydrocotyle dichondroides

synonyma: H. sibthorpioides var. dichondroides

Hydrocotyle dielsiana

Hydrocotyle dissecta (Pupečník zdřípatělý)

Listy má 3 - 7dílné obvejčitého tvaru.

Potřebuje vlhký substrát a polostín.

Hydrocotyle domingensis

Hydrocotyle elongata

synonyma: H. concinna, H. echinella, H. elongata var. echinella

Hydrocotyle exigua

synonyma: H. hirsuta var. exigua

Hydrocotyle filipes

synonyma: H. bonplandii var. filipes, H. capitata, H. poeppigii var. filipes

Hydrocotyle galapagensis

Hydrocotyle globiflora

synonyma: H. globifera

Hydrocotyle gracilis

Hydrocotyle grossularifolia

Hydrocotyle gunnerifolia

Hydrocotyle hazenii

Hydrocotyle hederacea

Hydrocotyle heteromeria

synonyma: H. americana var. heteromeria

Hydrocotyle hexagona

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Vyhovuje mu tropické a subtropické podnebí.

Hydrocotyle himalaica

synonyma: *H. javanica* var. *podantha*, *H. podantha*

Hydrocotyle hirsuta

oblasti: Portoriko

Hydrocotyle hirta

synonyma: *H. grossularioides*

Hydrocotyle hitchcockii

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Vyhovuje mu tropické a subtropické podnebí.

Hydrocotyle hookeri

Hydrocotyle humboldtii

synonyma: *H. humboldtii* var. *isoloba*, *H. humboldtii* var. *macrophylla*, *H. humboldtii* var. *pubescens*,
H. isoloba, *H. langsdorffii*, *H. quinqueloba* f. *subglabra*

Hydrocotyle hydrophila

synonyma: *H. tripartita* var. *hydrophila*

Hydrocotyle incrassata

Hydrocotyle indecora

synonyma: *H. marchantioides*

Hydrocotyle javanica

synonyma: *H. nepalensis*, *H. polycephala*

oblasti: Austrálie, Čína, Himálaj, Jáva, Korea, Pákistán, Tichý oceán

Roste v Číně, Koreji, Himálaji, Tichomoří, Austrálii a Indonésii. Stonky dokáží v kolénkách znovu zakořenit. Listy jsou ochlupené, 7milaločné, vroubkované, řapíkaté, průměru 2 - 5cm a laloky jsou

3úhlé. Květenstvím je 10 - 30tikvětý okolík, vlastní květy mají korunní lístky bílé. Plody jsou kulovité a průměru 1,5mm.

Hydrocotyle keelungensis

Hydrocotyle leucocephala (Pupečník bílý)

synonyma: H. callicephala, H. callicephala var. hirtella, H. citriodora, H. leucocephala var. minuta, H. leucocephala var. obtusiloba, H. leucocephala var. truncatiloba, H. maxonii, H. minuta

oblasti: Jižní Amerika

Pochází z Jižní Ameriky. Dorůstá výšky 20cm. Kvete bílými květy. Velmi rychle dokáže pokrýt vodní hladinu.

Vyhovuje mu mělčina s hloubkou kolem 10cm a teplota 18 - 23°C.

Hydrocotyle longipes

Hydrocotyle mannii

Hydrocotyle mexicana

Hydrocotyle microphylla

Hydrocotyle modesta

Hydrocotyle moschata

synonyma: H. colorata, H. moschata var. parvifolia, H. sibthorpioides var. laciniata

oblasti: Kalifornie

Hydrocotyle multifida

Hydrocotyle nepalensis

oblasti: Nepál

Hydrocotyle nixoides

Hydrocotyle novae-zelandiae

synonyma: *H. alsophila*, *H. amoena*, *H. dichondrifolia*, *H. intermixta*

oblasti: Nový Zéland

Hydrocotyle palmata

synonyma: *H. lachnolina*, *H. macbridei*

Hydrocotyle pennellii

Hydrocotyle peruviana

Hydrocotyle petelotii

Hydrocotyle poeppigii

Hydrocotyle prolifera

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Nevada, New Jersey, Oklahoma, Portoriko, Severní Karolína, Texas, Utah, Virginie

Hydrocotyle pseudoconferta

Hydrocotyle pseudosanicula

Hydrocotyle pterocarpa

Hydrocotyle pusilla

synonyma: *H. brevipes*, *H. costaricensis*

oblasti: Portoriko

Hydrocotyle quinqueloba

synonyma: *H. quinqueloba* var. *stella*

Hydrocotyle ramiflora

synonyma: *H. maritima*, *H. ramiflora* var. *maritima*

oblasti: Gruzie

Hydrocotyle ranunculoides

synonyma: H. adoensis, H. americana, H. batrachioides, H. cymbalarifolia, H. natans, H. nutans, H. ranunculoides f. minima, H. ranunculoides var. genuina, H. ranunculoides var. natans

oblasti: Afrika, Alabama, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Washington, Západní Virginie

Roste v Severní i Jižní Americe a místy i v Africe.

Hydrocotyle ribifolia

Hydrocotyle sagasteguii

Hydrocotyle salwinica

synonyma: H. himalaica subsp. salwinica, H. salwinica var. obtusiloba

Hydrocotyle setulosa

synonyma: H. laxiflora, H. masamunei

Hydrocotyle siamica

Hydrocotyle sibthorpioides

synonyma: Chondrocarpus sibthorpioides, H. americana var. monticola, H. monticola, H. rotundifolia

oblasti: Arkansas, Austrálie, Čína, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Indiana, Indie, Japonsko, Jižní Karolína, JV Asie, Kalifornie, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, Ohio, Pákistán, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Roste v tropické Asii, Pakistánu, Indii, Číně a Japonsku v podobě trvalky s plazivým, lehce kořenícím stonkem při styku se zeminou a zavlečená byla do Austrálie a Ameriky. Listy jsou obrysem okrouhlé, s mělce dlanitě naznačenými 7 - 9ti laloky, průměrem 0,5 - 2cm a srdčitou bází. Květenstvím je 3 - 10tikvětý okolík. Plody jsou kulaté a průměru 1mm. Celá se používá k přípravě salátů.

Hydrocotyle steyermarkii

Hydrocotyle sulcata

Hydrocotyle tambalomaensis

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Vyhovuje mu tropické a subtropické podnebí.

Hydrocotyle tonkinensis

Hydrocotyle torresiana

Hydrocotyle tripartita

synonyma: *H. muscosa*, *H. tripartita* var. *muscosa*

Hydrocotyle umbellata

synonyma: *H. caffra*, *H. fluitans*, *H. incrassata*, *H. petiolaris*, *H. polystachya*, *H. quinqueradiata*, *H. scaposa*, *H. umbellata* var. *umbellulata*, *H. umbellulata*, *H. vulgaris*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Portoriko, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v Severní i Jižní Americe.

Hydrocotyle urbaniana

Hydrocotyle venezuelensis

Hydrocotyle verticillata

synonyma: *Centella homalocarpa*, *Centella verticillata*, *H. ambigua*, *H. australis*, *H. bonariensis* var. *tribotrys*, *H. canbyi*, *H. cuneata*, *H. polystachya* var. *triradiata*, *H. prolifera*, *H. racemosa*, *H. superposita*, *H. umbellata* var. *ambigua*, *H. verticillata* var. *longipedunculata*, *H. verticillata* var. *pluriradiata*, *H. verticillata* var. *racemosa*, *H. verticillata* var. *tenella*, *H. verticillata* var. *tredecimnervis*, *H. verticillata* var. *triradiata*, *H. vulgaris* var. *verticillata*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Kalifornie, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Oregon, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky 15cm. Listy mají okrouhlý tvar a svěže zelenou barvu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *triradiata*

Vyhovuje mu teplota 10 - 25°C.

Množí se řízkováním oddenku.

Hydrocotyle vestita

Hydrocotyle vulgaris (Pupečník obecný)

oblasti: Andalusie, Apeniny, Česká republika, Florida, Írán, Irsko, Island, Katalánsko, Makaronésie, Německo, Polsko, Středozemí, Švýcarsko

Roste v severní Africe, Evropě a Floridě. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 5 - 15 (i 25)cm. Lodyha je plazivá a mírně vystoupavá. Dokáže dorůst až 60cm délky a v uzlinách zakořeňuje. Listy jsou střídavé, mají okrouhlý tvar s vroubkovaným okrajem, velikost (0,5 -) 2 - 4cm a dlouze řapíkaté. Kvete bílými květy ve staženém okolíku velikosti 0,5 - 12cm, vlastní květy mají korunní lístky délky 0,7 - 0,9mm. Patří mezi chráněné druhy C3. Je prudce jedovatý.

Vyhovuje mu mělčina o hloubce kolem 20cm, olšiny, břehy, bahno nebo rašeliniště. Ideální teplotní rozmezí je 4 - 25°C.

Množí se řízky.

Hydrocotyle wilfordii

Hydrocotyle wilsonii

Hydrocotyle yanghuangensis

synonyma: H. quinqueloba f. yanghuangensis

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Vyhovuje mu subtropické a tropické vlhké prostředí.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hydrocotyle-vulgaris/>

http://rybicky.net/atlasrostlin/hydrocotyle_dissecta

http://rybicky.net/atlasrostlin/hydrocotyle_vulgaris

<http://www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-278>

<http://www.aquapage.cz/Rostliny.php?detail=58>

<https://www.rostliny.net/>