

Geoffroea

čeleď: Fabaceae

Roste v Jižní Americe v podobě stromu či keře. Lokality jednotlivých druhů se nepřekrývají. Listy jsou střídavé, zpeřené, vlastní lístky bývají vstřícné. Kvete růžovými, fialovými nebo žlutými květy vydávajícími nepříjemné aroma, bývají prakticky přisedlé v terminálních latách či hroznech, listeny i listence bývají malé a opadavé, kalich uťatý či hluboce zubatý, pavéza prakticky kulatá a semeníky mají dlouhé stopky. Plodem je peckovitý široce vejčitý lusk obsahující 1 semeno.

Geoffroea decorticans

synonyma: *G. spinosa*, *Gourliea chilensis*, *Gourliea decorticans*, *Gourliea decorticata*, *Gourliea spinosa*, *Lucuma spinosa*

oblasti: Peru, S Argentina, S Čile, Střední Argentina, Střední Čile, SZ Argentina, Z Argentina

Roste v Čile, Argentině a Peru v podobě trnitého stromu či keře. Dorůstá výška až 10m. Větve mají až 2cm trny. Listy jsou dlouhé do 7cm, zpeřené, tvořené 3 - 13ti lístky, vlastní lístky jsou mírně obvejčité, celokrajné, mohou být hedvábité a dlouhé do 3,5cm. Květenstvím je až 8cm 2 - 5tičetný hrozen, vlastní květy jsou oranžové až žluté, červeně pruhované a dlouhé do 1cm. Plody jsou široce vejčité, holé, červené až růžové a dlouhé do 3,5cm.

Geoffroea horsfieldii

Geoffroea inermis

synonyma: *Andira inermis*, *Vouacopoua inermis*

oblasti: S Jižní Amerika, Střední Amerika, Z Afrika

Roste v tropické Americe a západní Africe. Listy jsou zpeřené, tvořené 9 - 15ti lístky, vlastní lístky jsou lesklé, podlouhlé, zašpičatělé, prakticky kožovité, dlouhé 5 - 8cm, široké 2,5 - 3,5cm a řapíčkaté. Palísky jsou štětinaté, občas nápadnější. Květenstvím je bohatá lata, vlastní květy jsou růžovofialové, dlouhé 1cm, kalich zvonkovitý, dlouhý až 4mm. Plody jsou zkoseně obvejčité a hrotené.

Geoffroea spinosa

synonyma: *G. bredemeyeri*, *G. striata*, *G. superba*, *Robinia striata*

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Paraguay, SV Brazílie, Venezuela, Z Brazílie

Roste v Ekvádoru, Brazílii, Paraguayi, Bolívii, Kolumbii a Venezuele.

Geoffroea striata

synonyma: *G. superba*, *Robinia striata*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Galapágy, Peru, Venezuela

Roste od Peru a Venezuely po Brazílii a Bolívii. Listy jsou zpeřené, tvořené 13 - 25ti lístky, vlastní lístky střídavé až téměř vstřícné, dlouze obvejčité, tupé, řídce ochlupené, dlouhé 1,6 - 2cm a široké 6 - 8mm. Květenstvím je rezavě plstnatý hrozen, vlastní květy mají špičatý kalich délky 6 - 7mm s až 2mm zuby a stopky jsou dlouhé 2 - 3mm. Plody jsou dřevnaté, široce vejčité a obsahují 1 semeno.

Geoffroea surinamensis

synonyma: Andira retusa, Andira surinamensis, G. retusa, Vouacopoua retusa

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Karibik, Peru, Surinam

Roste od Brazílie po Trinidad v podobě stromu. Dorůstá výšky až 25m. Listy jsou zpeřené, vlastní lístky jsou dlouze mírně obvejčité, tupé, kožovité, lesklé a na spodní straně síťnatě žilkované. Květenstvím je mírně plstnatá lata, vlastní květy mají 2 - 3mm stopky, kalich délky 6mm a korunní lístky jsou dlouhé 1,2cm. Plody jsou vejčité, holé a dlouhé 4cm.

Geoffroea violacea

synonyma: Acouroa violacea

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1926>

<https://www.rostliny.net/>