

# Prosopanche

čeleď: Hydnoraceae

Roste ve střední a Jižní Americe v podobě parazitické rostliny. Nejznámějším druhem je *P. americana*.

## Prosopanche americana

synonyma: *Hydnora americana*, *P. burmeisteri*, *P. burmeisteri* var. *bettfreundii*

oblasti: Peru, S Argentina, S Brazílie

Roste v Peru, Argentině a Brazílii. Protože postrádá chlorofyl, postrádá zelenou barvu. Nevytváří ani listy ani kořeny, ale parazituje na hostiteli *Prosopis caldenia* nebo jiných druhů tohoto rodu. Kveté 3četnými květy s dřevnatějícími mohutnými tepalami v barvě hnědé až červenohnědé. Plodem je jedlá šťavnatá bobule obsahující drobná semena.

## Prosopanche bonacinae

synonyma: *P. bertonensis*, *P. bertonensis* f. *piriformis*, *P. bertonensis* var. *stricta*, *P. burmeisteri* var. *minor*, *P. clavata*, *P. mazzuchii*, *P. minor*

oblasti: Argentina, Paraguay, Rio Grande do Sul

Roste v Argentině, Paraguayi a Brazílii.

## Prosopanche costaricensis

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice.

<https://www.rostliny.net/>