

Raphiolepis (Hlohovka)

čeleď: Rosaceae

Roste ve východní a jihovýchodní Asii v podobě stálezeleného beztrnného keře nebo nízkého stromu. Listy jsou jednoduché, kožovité, střídavé, zastříhované až celokrajné. Květenstvím je terminální lata či hrozen, vlastní květy jsou oboupohlavné, barva bílá až růžová, mají 5 kališních a korunních lístků a 15 - 20 tyčinek. Plody jsou kulovité, vejčité až obvejčité, velikosti 1 - 2cm a obsahují 1 - 2 semena. Využívají se také pro bonsaje.

Dokáže být částečně mrazu- i chladuvzdorné. Vyhovuje jim plné slunce a dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se polodřevitými řízký.

Raphiolepis ferruginea

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi

Roste v Číně v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky až 10m. Větve jsou v mládí černohnědé, později šedočerné a rezavě ochlupené. Listy jsou mírně kopinaté, kožovité, v mládí plstnaté, celokrajné nebo pilovité, špičaté, dlouhé 6 - 15cm, široké 2,5 - 5cm, báze klínovitá, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5cm. Květenstvím je terminální bohatá lata, vlastní květy jsou bílé, mají 2 - 4mm stopku, průměr 0,8 - 1cm a korunní lístky jsou dlouhé 4mm. Plody jsou červené, kulaté a v průměru mají 5 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. ferruginea - listy celokrajné, podvinuté, na spodní straně rezavě plstnaté
- var. serrata - listy v druhé 1/2 pilovité

Raphiolepis indica

synonyma: Crataegus indica, Crataegus rubra, Crataegus sinensis, Eriobotrya metrosideros, Mespilus sinensis, Opa metrosideros, Raphiolepis indica, R. gracilis, R. indica var. typica, R. loureiri, R. parvibracteolata, R. rubra, R. rugosa, R. sinensis, Syzygium metrosideros

oblasti: Indonésie, Japonsko, Kambodža, Laos, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Japonsku, Kambodži, Indonésii, Laosu, Thajsku a Vietnamu v podobě keře až nízkého stromu. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou v mládí růžově fialově hnědé a ochlupené. Palisty jsou drobné a opadávající. Listy jsou vejčité až kopinaté, kožovité, lesklé, mírně vroubkované až pilovité, tupé až ocasovité, dlouhé 2 - 8cm, široké 1 - 4cm, báze protáhlá, spodní strana může být řídce ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,8cm. Květenstvím je terminální lata nebo hrozen, vlastní květy jsou dlouhé 1 - 1,3cm, mají 0,5 - 1,5cm stopku, kališní lístky jsou dlouhé do 1,5mm, korunní lístky jsou bílé nebo narůžovělé, obvejčité či kopinaté, dlouhé 5 - 7mm a široké 4 - 5mm. Plody jsou růžovofialové až černé a v průměru mají 5 - 6mm. Používá se pro bonsajové pěstování. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Ballerina' - výška do 1m; květy tmavě růžové
- 'Charisma' - listy malé; květy růžové a bohaté

- 'Clara' - výška do 1,2m; květy bílé
- 'Coate's Crimson' - výška do 1,2m; květy červenorůžové
- 'Enchantress' - zakrslá; listy lesklé; květy drobné, růžové
- 'Fascination' - výška do 90cm; květy tmavě růžové
- 'Harbinger of Spring' - výška 1,2 - 1,8m; květy tmavě růžové
- var. *hirranensis*/R. *hiiranensis* - Tchaj-wan; listy mírně obkopinaté, dlouhé 4 - 5cm, široké 1,5 - 2cm; květenství chudé, řídce ochlupené, listeny kopinaté, dlouhé 4mm, vlastní květy mají stopku délky 0,7 - 1,5cm
- 'Indian Princess' - kompaktní, široký, hustý; listy velké; květenství široké, květy růžové, později bílé
- var. *indica*/Crataegus *indica*/Crataegus *rubra*/Mespilus *sinensis*/R. *gracilis*/R. *parvibracteolata*/R. *rubra*/R. *rugosa*/R. *sinensis* - listy vejčité (i obvejčité či kopinaté), vroubkované, dlouhé 2 - 8cm, široké 1,5 - 4cm; květenství rezavě plstnaté, bohaté, listeny kopinaté, dlouhé 2 - 7mm a květy mají stopku délky 0,5 - 1,5cm
- 'Jack Evans' - kulatý habitus; květenství velké, květy růžové
- 'Majestic Beauty' - výška do 1,8m; květy bledě růžové
- 'Pinkie' - výška do 1,2m; květy růžové
- 'Rosea' - výška do 1,2m; květy v odstínech růžové
- 'Rosea Dwarf' - výška do 1,2m; květy bledě růžové
- 'Snow White' - rozkladitý; květenství řídké, bílé
- 'Spring Rapture' - kompaktní; květy bohaté, růžové až růžovočervené
- 'Springtime' - kompaktní; výška 1,5m; květy růžově hnědé, později tmavě růžové
- var. *tashiroi* - Tchaj-wan; listy eliptické, tupě pilovité, dlouhé 5 - 7cm, široké 1,5 - 2cm; květenství rezavě plstnaté, bohaté, listeny kopinaté, dlouhé 7mm, květy mají 0,3 - 1cm stopku
- 'White Enchantress' - zakrslý, kompaktní; květy drobné a bílé

Raphiolepis integerrima

synonyma: R. *integerrima* var. *mertensii*, R. *mertensii*, R. *umbellata* var. *mertensii*

oblasti: Japonsko, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu a Japonsku v podobě keře nebo stromu. Listy jsou mírně obvejčité, kožovité, celokrajné, podvinuté, tupé, dlouhé 4 - 7cm, široké 2 - 3,5cm, báze klínovitá a řapíky prakticky chybí. Květenstvím je terminální lata, vlastní květy mají eliptické kališní lístky délky 2,5 - 3mm, korunní lístky jsou dlouhé 1cm, široké 5mm a mají 20 tyčinek. Plody jsou kulaté velikosti 8mm.

Raphiolepis lanceolata

synonyma: R. *hainanensis*, R. *indica* var. *angustifolia*

oblasti: Guangxi, Hainan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou růžovofialovočerné a v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, kožovité, lesklé, řídce pilovité, tupé až zašpičatělé, dlouhé 3 - 7,5cm, široké 0,5 - 1,4cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je terminální lata, vlastní květy mají 2mm stopku, kališní lístky kopinaté délky 4 - 6mm, korunní lístky bílé či narůžovělé, mírně kopinaté, dlouhé 6 - 7mm, široké 1,5 - 4mm a mají 15 tyčinek. Plody jsou černé, ochlupené, kulaté a mají velikost 4 - 7mm.

Raphiolepis major

synonyma: R. *indica* var. *grandifolia*

oblasti: Fujian, Jiangsu, Jiangxi

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou zelené. Listy jsou mírně obvejčité, kožovité, v mládí na žilkách řídce ochlupené, jemně vroubkované, špičaté, dlouhé 7 - 15cm, široké 4 - 6cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm. Květenstvím je terminální bohatá lata, vlastní květy mají 0,7 - 1,5cm stopku, průměr 1,3 - 1,5cm, kališní lístky jsou 3úhle kopinaté délky 5 - 6mm a korunní lístky jsou bílé a vejčité. Plody jsou černé, kulaté a v průměru mají 0,7 - 1cm.

Rhaphiolepis philippinensis

synonyma: Eriobotrya acuminatissima, Eriobotrya philippinensis, Photinia luzoniensis

oblasti: Borneo, Filipíny

Roste na Filipínách a Borneu v podobě keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky do 10 - 18m. Borka je v mládí ochlupená. Palisty jsou 3úhlé, dlouho vytrvávající, dlouhé 2,5 - 4mm a široké 0,7 - 1,5mm. Listy jsou obvejčité až kopinaté, zpravidla asymetricky zastříhované, špičaté, kožovité, dlouhé 5 - 17cm, široké 2,5 - 5cm, báze mírně zaoblená, žilnatinu tvoří 7 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm. Květenstvím je terminální lata délky 2 - 7,5cm, vlastní květy mají 3úhlé kališní lístky délky 1,5 - 3,5mm, šířky 1,2 - 2mm, korunní lístky jsou eliptické až kulaté, dlouhé do 6,5mm, široké 4,5mm, jsou bílé a mají 16 - 20 tyčinek. Plody jsou vejčité až prakticky kulaté, tmavě růžovofialové, dlouhé 6 - 9mm, široké 4 - 9mm a mají 1 - 2 semena.

Rhaphiolepis salicifolia

synonyma: R. cheniana, R. kwangsiensis

oblasti: Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2,5 - 6m. Větve jsou šedohnědé až hnědočerné, v mládí červené. Listy jsou kopinaté (i obvejčité), lesklé, jemně vroubkované, špičaté, dlouhé 6 - 9cm, široké 1,5 - 2,5cm, báze protáhlá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je terminální lata, vlastní květy mají v průměru 1cm, stopka měří 2 - 5mm, kališní lístky jsou 3úhle kopinaté, korunní lístky jsou bílé, eliptické až obvejčité, dlouhé 6mm, široké 2mm a mají 20 tyčinek. Plody jsou tmavěhnědé, kulaté a v průměru mají 6 - 9mm.

Rhaphiolepis umbellata

synonyma: Laurus umbellata, Mespilus sieboldii, Opa japonica, R. japonica, R. japonica var. integerrima, R. ovata, R. umbellata f. integerrima

oblasti: Japonsko, Korea

Roste v Japonsku v podobě keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 1 (i 4)m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou kožovité, mírně obvejčité, pouze na konci s mělkými zuby, tmavězelené, dlouhé 2 - 10cm, široké 1,2 - 4cm, spodní strana v mládí plstnatá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je vzpřímená lata nebo hrozen délky 5 - 10cm, vlastní květy jsou bílé, široké 1,5 - 2cm, korunní lístky jsou obvejčité, mají 20 tyčinek a kališní lístky jsou neznámé. Plody jsou kulaté, temně růžovofialové a v průměru mají 0,7 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Minor' - zakrslý; listy drobné, seskupené na koncích větví; květy drobné, bílé, aromatické
- f. ovata - Korea, Japonsko; listy větší a obvejčité, zakulacené, i mírně zubaté

Odolává teplotám do -15°C.

Rhaphiolepis x delacourii

Kříženec *R. indica* a *R. umbellata*. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kožovité, obvejčité, v horní 1/2 zubaté, tupé až zakulacené a dlouhé 3 - 7cm. Květenstvím je vzpřímená kuželovitá lata o délce 7 - 10cm, vlastní květy jsou růžové, v průměru mají 1,2 - 1,8cm a stopky jsou ochlupené. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Coate's Crimson' - květy červené až růžovočervené; pomalý růst
- 'Enchantress' - kompaktní; květenství velké, růžové
- 'Majestic Beauty' - listy velké a tmavězelené; květenství široké až 25cm, růžové, aromatické
- 'Spring Song' - květy světle růžové

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2928>

<https://www.rostliny.net/>