

Pachycymbium

čeleď: Asclepiadaceae

Roste v Africe a na Arabském poloostrově jako sukulent.

Pachycymbium abayense

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Pachycymbium baldratii

oblasti: Eritrea

Roste v Eritrei.

Pachycymbium carnosum

oblasti: Limpopo, Mpumalanga

Roste v JAR.

Pachycymbium decaisneanum

synonyma: Boucerosia decaisneana, Caralluma commutata subsp. hesperidum, Caralluma decaisneana, Caralluma decaisneana subsp. hesperidum, Caralluma hesperidum, Desmidorchis decaisneana, Orbea decaisneana, Orbea decaisneana subsp. hesperidum, Stapelia decaisneana

oblasti: Alžírsko, Maroko, Mauretánie, Senegal, Súdán

Roste v Maroku, Alžírsku, Mauretáni, Senegalu a Súdánu v trsech. Stonky jsou bílozelené, nahnědle mramorované, válcovité, na vrcholu mírně zúžené, dlouhé 10 - 20cm, široké 1,5 - 2cm, opatřené 3 - 6ti žebry s šídlovitými bradavkami délky 0,7 - 1,5cm. Kvete po 1 - 3ks tmavě růžovofialovými nebo hnědočervenými plochými květy o průměru 2 - 2,5cm, korunní lístky jsou úzce vejčité, bělavě ochlupené, dlouhé 0,7 - 1,2cm a široké 5 - 8mm.

Množí se odnožemi.

Pachycymbium keithii

oblasti: Svazijsko

Roste ve Svazijsku.

Pachycymbium lancasteri

oblasti: Limpopo, Mpumalanga

Roste v JAR.

Pachycymbium meintjesianum

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

<https://www.rostliny.net/>