

Apollonias

čeleď: Lauraceae

Jedná se o stálezelený keř nebo strom. Listy jsou střídavé. Kvete v terminálních nebo úžlabních latách, vlastní květy jsou drobné a kalich nálevkovitý a vytrvalý. Plodem je bobule.

Apollonias arnottii

synonyma: *A. arnottii* var. *beddomei*

Apollonias barbujana

synonyma: *A. canariensis*, *Laurus barbujana*, *Laurus canariensis*, *Laurus reticulata*

oblasti: Makaronésie

Roste na Kanárských ostrovech a Madeiře v podobě křivolakého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 30)m. Borka je drsná, podélně popraskaná. Dřevo bývá označováno jako kanárský eben. Větve jsou v mládí holé, pupeny načervenalé a holé. Listy jsou střídavé až téměř vstřícné, kožovité, variabilní, eliptické až vejčitě kopinaté, lesklé, tmavězelené, mírně podvinuté, dlouhé 6 - 8 (i 15)cm a řapíky jsou tlusté, dlouhé 0,5 - 1,3cm. Bývají napaden kulovitými hálkami. Květenstvím je 2 - 7cm dlouhá lata na až 3cm stopce, vlastní květy jsou oboupohlavné, korunní lístky špičaté nebo tupé, dlouhé 3 - 4,5mm, nazelenalé či žlutobílé, vonné a bývají seskupené po 3ks. Plodem je vejčitá zelená až modročerná vejčitá dužnatá bobule délky 1 - 2cm.

Vyhovují ji vavřínové lesy, plné slunce nebo polostín, teplo a suchá hlinitá půda.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/apollonias-barbujana/>

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1487>

<http://listnate-stromy.atlasrostlin.cz/apollonias-barbusano>

<https://www.rostliny.net/>