Aeginetia

synonyma: Gasparinia, Phelypea, Tsiam-cumula

čeleď: Orobanchaceae

Nejznámějším druhem je A. indica.

Aeginetia indica
synonyma: A. aeginetia, A. boninensis, A. indica var. gracilis, A. japonica, A. mairei, Orobanche aeginetia, Phelipaea indica

oblasti: Indie, Nová Guinea, Thajsko

Roste v tropická Asii. Patří mezi jednoleté parazitické nezelené rostliny. Plodem je tobolka. Kořeny a květy se používají v medicíně.

Parazituje na tropické trávě Setaria palmifolia (Bér palmolistý), dále může využívat rýže seté, cukrové třtiny, kukuřice a některých bambusů.

Aeginetia mirabilis
synonyma: A. centronia, Centronota mirabilis, Gasparinia mirabilis

Aeginetia pedunculata
synonyma: A. abbreviata, A. acaulis, A. saccharicola, A. trimenii, Orobanche acaulis, Orobanche pedunculata

oblasti: Himálaj, Indie, Indonésie, Kambodža, Malajsie, Pákistán

Roste od Himálaje po Indonésii. Dorůstá výšky do 15cm. Květy mají 2 - 10cm stopku, kalich délky 3 - 5cm v barvě růžové až bělavé, koruna má délku 6 - 7,5cm, šířku 5cm a je žlutobílá s růžovofialovými laloky. Plody mají v průměru 2cm a obsahují malá hnědá semena.

Aeginetia selebica

Aeginetia sessilis

Aeginetia sinensis
synonyma: A. indica f. japonica

https://www.rostliny.net/