

Syreitschikovia

čeleď: Asteraceae

Syreitschikovia spinulosa

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán

Roste v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Listy jsou vejčité, bazální přecházejí v řapík, lodyžní jsou objímavé, ouškaté, trnité, zelené a na spodní straně plstnaté. Kvete samostatnými úbory.

Syreitschikovia tenuifolia

synonyma: *Jurinea tenuis*, *Serratula tenuifolia*

oblasti: Čína, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán

Roste v Číně, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu v trsech. Dorůstá výšky 5 - 40cm. Listy jsou čárkovité, špičaté, drobně ochlupené, zelené, lesklé a na spodní straně bíle ochlupené. Květenstvím je samostatný úbor s válcovitým zákrovem.

Vyhovují jí dobře propustné půdy a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Syreitschikovia tenuis

Další informace:

<http://skalnicky.kadel.cz/t/kvResult.asp-Rod=Syreitschikovia.htm>

<https://www.rostliny.net/>