

## Rhizophora (Kořenovník)

čeleď: Rhizophoraceae

### Rhizophora apiculata

oblasti: Austrálie, Brunej, Čína, Filipíny, Indie, Jáva, Kalimantan, Kambodža, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Nová Kaledonie, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Sabah, Sarawak, Srí Lanka, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam

Roste v Indii, východní a jihovýchodní Asii a Austrálii.

Vyhovuje mu hluboké bahno v pásu s vysokým přílivem.

### Rhizophora mangle (Kořenovník obecný)

oblasti: Francouzská Guyana

### Rhizophora mucronata

oblasti: Austrálie, Brunej, Filipíny, Indie, Írán, Japonsko, Kalimantan, Kambodža, Madagaskar, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Nová Kaledonie, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Sabah, Sarawak, Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam

Roste od Madagaskaru a Indie přes východní a jihovýchodní Asii po Austrálii.

Roste při mořském pobřeží.

### Rhizophora racemosa (Kořenovník hroznatý)

oblasti: Francouzská Guyana

### Rhizophora samoensis

oblasti: Nová Kaledonie, Tichý oceán

Roste na Fidži, Nové Kaledonii, Samoe, Tonga a Vanuatu. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. neocaledonica - Nová Kaledonie
- var. samoensis - Samoa

## Rhizophora stylosa

oblasti: Austrálie, Filipíny, Japonsko, Jáva, Kambodža, Nová Kaledonie, Papua-Nová Guinea, Sabah, Sulawesi (Celebes), Tchaj-wan, Tichý oceán, Vietnam

Roste ve východní a jihovýchodní Asii po Austrálii.

## Rhizophora x harrisonii

### Rhizophora x lamarckii

oblasti: Austrálie, Čína, Nová Kaledonie

Roste v Austrálii, Číně a Nové Kaledonii. Jedná se o hybrid R. apiculata a R. stylosa.

## Rhizophora x selala

oblasti: Nová Kaledonie, Tichý oceán

Roste na Fidži, Nové Kaledonii, Samoe a Tongu.

## Rhizophora x tomlinsonii

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2932>

<https://www.rostliny.net/>