

Cabomba (Kabomba)

čeleď: Cabombaceae

Pochází ze Severní Ameriky, ale byla zavlečená i jinde, např. do Austrálie. Ponořené listy jsou jemně dělené, potažené želatínou a plovoucí jsou štítovitě až ledvinitě s řapíkem napojeným v 1/2 délky čepele. Kvete malými bílými, žlutými nebo fialovými květy se 3mi korunními lístky. Používá se i v akvaristice. Nejznámějším druhem je *C. caroliniana*. Do kontrastu k ní se používá do červena zbarvená *C. furcata*.

Vyhovuje jí hrubé dno s vysokým obsahem živin, plné světlo, stojatá voda a hloubka do 45cm.

Množí se řízkováním.

Cabomba aquatica (Kabomba vodní)

oblasti: Amazonas, Francouzská Guyana, Surinam

Roste v Jižní Americe jako trvalka. Dorůstá délky do 0,5 (i 2 - 3)m. Lodyha je větvená. Podvodní listy jsou dlouhé 8,5cm, široké 9,5cm, dlanitě dělené na 3 - 5cm dlouhé nitkovité dílky se šířkou 0,4 - 3 (i 4)mm. Plovoucí listy jsou štítovitě oválné až kulaté. Kvete žlutými zvonkovými květy.

Vyhovuje jí čerstvá stojatá voda s pH 6 - 7,5.

Množí se stonkovými řízkami.

Cabomba caroliniana (Kabomba karolínská)

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Čína, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Indie, J Brazílie, Japonsko, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Malajsie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Paraguay, Pennsylvania, Queensland, Rhode Island, Severní Karolína, SV Argentina, Tennessee, Texas, Uruguay, Virginie, Washington

Roste v USA, Kanadě, Brazílii, Paraguaji, Uruguayi a Argentině jako trvalka. Stonek drží při dnu za oddenek s kořeny. Stonek je zelený až šedozelený, občas hnědočervený. Vytváří 2 druhy listů, ponořené vyrůstají v páru (i 3četném přeslenu), celkově jsou 1/2kulaté až ledvinitě, dlouhé 2 - 3cm, široké 3 - 6cm s 0,5 - 2cm dlouhým řapíkem, jemně čárkovitě dělené, plovoucí jsou střídavé, mírně eliptické až čárkovité, dlouhé do 1,3cm a široké 6,4mm. Kvete bílými nebo narůžovělými 3četnými květy průměru 0,6 - 1,3 (i 3,5)cm a korunní lístky mají na bázi 2 žluté skvrny. Semena jsou kulovitá až eliptická, dlouhá 1,5 - 3mm a široká 1 - 1,5mm. Dokáže růst rychlostí až 5cm/den. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *caroliniana* - bílé korunní lístky
- var. *flavida* - žluté korunní lístky
- var. *pulcherrima*

Vyhovují jí pomalu tekoucí vody, jezera a tůň s bahnitým nebo písčitém dnem, hloubkou do 3 (i 10)m a teplotou do 25 (i 27)°C.

Množí se semeny nebo řízky.

Cabomba furcata (Kabomba brazilská)

oblasti: Brazílie, Kuba, Portoriko

Roste od Floridy po Jižní Ameriku. Dorůst délky 30 - 80cm a šířky 8cm. Kvete růžovofialovými květy.

Cabomba haynesii

oblasti: Florida, Portoriko

Roste v USA a Karibiku.

Cabomba palaeformis

oblasti: Florida

Cabomba paliformis

<https://www.rostliny.net/>