

Amasonia

čeleď: Lamiaceae

Roste v tropické střední a Jižní Americe v podobě byliny nebo polokeře (i keře). Listy jsou jednoduché, střídavé nebo řídké a zpravidla seskupené pod květenstvím. Květenství je terminální, latnaté nebo hroznovité, vzpřímené, krátce stopkaté s barevnými listeny, vlastní květy mohou být dále ve 3četných vrcholíčcích, kalich je zvonkovitý s 5ti laloky, koruna žlutá nebo bílá s 5ti laloky, mírně 2pyská a má 4 tyčinky. Plodem je černá lesklá peckovice.

Amasonia angustifolia

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

Amasonia calycina

oblasti: Brazílie, Guyana

Roste v Brazílii a Guyaně v podobě keře nebo polokeře. Povrch je lepivý a červeně ochlupený. Listy jsou kopinaté až eliptické, mohou být řídce jemně ochlupené a dlouhé do 17cm. Květenství je převislé, dlouhé do 20cm a růzovofialovočerveně ochlupené s listeny kopinatými, červenými, dlouhými do 19cm, kalich je červený, žláznatý, dlouhý do 1,9cm a koruna je dlouhá do 3cm a má zahnuté laloky.

Amasonia campestris

oblasti: Francouzská Guyana, Guyana, Karibik, Kolumbie, SV Brazílie, Venezuela

Roste na Trinidadu, Guyanách, Brazílii, Venezuele a Kolumbii v podobě byliny nebo polokeře. Dorůstá výšky do 2m. Povrch je hnědě ochlupený. Listy jsou eliptické až obvejčité nebo obkopinaté, jemně pilovité, mohou být ochlupené a dlouhé až 28cm. Květenství je dlouhé do 30cm, listeny jsou eliptické nebo kopinaté, načervenalé, zpravidla i nažloutlé nebo až zelené, dlouhé do 5cm, kalich je červený, žlutozelený či načervenalý, dlouhý do 1,2cm, koruna je dlouhá 3cm a laloky jsou vejčité.

Amasonia hirta

oblasti: Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii a Paraguayi.

Amasonia obovata

oblasti: Brazílie, Venezuela

Roste v Brazílii a Venezuele.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1420>

<https://www.rostliny.net/>