

Handroanthus

čeleď: Bignoniaceae

Roste v latinské Americe a na jih po Argentinu, Paraguay a Čile v podobě stromu.

Handroanthus albus

synonyma: *Tabebuia alba*, *Tecoma alba*

oblasti: Bahia, Brazílie, Espírito Santo, Goiás, J Brazílie, Jižní Amerika, JV Brazílie, JZ Brazílie, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Střední Brazílie, V Brazílie, V Jižní Amerika

Roste v Brazílii.

Handroanthus arianae

synonyma: *Tabebuia arianae*

Handroanthus barbatus

synonyma: *Bignonia barbata*, *Couralia toxophora*, *Tabebuia barbata*, *Tecoma barbata*, *Tecoma toxophora*, *Zeyheria barbata*

Handroanthus billbergii

synonyma: *Tabebuia billbergii*, *Tecoma billbergii*

Handroanthus botelhensis

synonyma: *Tabebuia botelhensis*

Handroanthus bureavii

synonyma: *H. dentatus*, *Tabebuia bureavii*, *Tecoma dentata*

Handroanthus capitatus

synonyma: *Tabebuia capitata*, *Tabebuia glomerata*, *Tabebuia hypolepra*, *Tecoma capitata*, *Tecoma leucoxydon* var. *miquelii*, *Tecoma leucoxydon* var. *pentaphylla*

Handroanthus catarinensis

synonyma: *Tabebuia catarinensis*

Handroanthus chrysanthus

synonyma: *Bignonia chrysantha*, *Tabebuia chrysantha*, *Tabebuia rufescens*, *Tecoma chrysantha*, *Tecoma evenia*, *Tecoma palmeri*

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe v podobě stromu. Kvete pouze několik dnů žlutými květy na začátku období dešťů.

Vyhovují mu suché tropické lesy.

Handroanthus chrysotrichus

synonyma: *Gelsemium chrysotrichum*, *H. chrysotrichus* var. *obtusata*, *Tabebuia chrysotricha*, *Tabebuia chrysotricha* var. *obtusata*, *Tecoma chrysotricha*, *Tecoma chrysotricha* var. *obtusata*, *Tecoma flavescens*, *Tecoma grandis*, *Tecoma obtusata*, *Tecoma ochracea* var. *denudata*

oblasti: Brazílie, Jižní Amerika, V Jižní Amerika

Roste v Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 8 (i 20)m při průměru koruny 8 - 11m. Květy mají barvu žlutou až červenou.

Je středně odolný na sucho.

Handroanthus coralibe

synonyma: *Tabebuia coralibe*

Handroanthus cristatus

synonyma: *Tabebuia cristata*

Handroanthus guayacan

synonyma: *Tabebuia guayacan*, *Tecoma guayacan*

oblasti: Campeché, Chiapas, J Mexiko, J Severní Amerika, JV Mexiko, Mexiko, Oaxaca, Quintana Roo, Severní Amerika, Tabasco, V Mexiko, Veracruz

Roste v Mexiku.

Handroanthus heptaphyllus

synonyma: *Bignonia heptaphylla*, *H. avellanadae* var. *paullensis*, *H. eximius*, *H. impetiginosus* var. *lepidotus*, *Tabebuia avellanadae* var. *paulensis*, *Tabebuia eximia*, *Tabebuia heptaphylla*, *Tabebuia impetiginosa* var. *lepidota*, *Tabebuia ipe*, *Tecoma curialis*, *Tecoma eximia*, *Tecoma impetiginosa* var. *lepidota*, *Tecoma ipe*, *Tecoma ipe* f. *glabra*, *Tecoma ipe* f. *grandiflora*, *Tecoma ipe* f. *lepidota*, *Tecoma ipe* f. *parviflora*, *Tecoma ipe* var. *desinens*

oblasti: Brazílie, J Brazílie, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Paraguay, Paraná, Uruguay, V Jižní Amerika

Roste v Brazílii, Paraguayi a Uruguayi v podobě poloopadavého stromu. Dorůstá výšky až 40m. Borka je šedohnědá a drsná. Listy jsou vstřícné, 3četné, vlastní lístky eliptické a oboustranně špičaté. Kvete trubkovitým bělavými až růžovými květy ještě před olistěním. Plodem je čárkovitý hnědý lusk délky 30 - 40cm, šířky 1 - 1,5cm a obsahuje cca 150 okřídlených semen.

Vyskytuje se na pobřeží vodních toků.

Množ se semeny.

Handroanthus impetiginosus

synonyma: *Gelsemium avellaneda*, *H. avellaneda*, *Tabebuia avellaneda*, *Tabebuia dugandii*, *Tabebuia impetiginosa*, *Tabebuia ipe* var. *integra*, *Tabebuia nicaraguensis*, *Tabebuia palmeri*, *Tabebuia schunkevigoi*, *Tecoma adenophylla*, *Tecoma avellaneda*, *Tecoma avellaneda* var. *alba*, *Tecoma impetiginosa*, *Tecoma integra*, *Tecoma ipe* f. *leucotracha*, *Tecoma ipe* var. *integra*, *Tecoma ipe* var. *integrifolia*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, J Jižní Amerika, J Severní Amerika, Jižní Amerika, Karibik, Malé Antily, Mexiko, Paraguay, S Argentina, S Mexiko, Severní Amerika, Střední Amerika, Tobago, Trinidad, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste od Mexika po Argentinu v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky do 30m při průměru kmene do 80cm. Borka je hnědošedá. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, dlanitě 5tičetné, vlastní lístky eliptické až kopinaté, špičaté a na bázi kulaté. Kvete trubkovitými růžovými květy, vnitřní strana trubky je bílá, při vrcholu nažloutlá, cípy růžové.

Handroanthus incanus

synonyma: *Tabebuia incana*

Handroanthus lapacho

synonyma: *Tabebuia lapacho*, *Tecoma lapacho*

oblasti: Argentina, Bolívie, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, SZ Argentina, Z Jižní Amerika

Roste v Argentině a Bolívii.

Handroanthus obscurus

synonyma: *Tabebuia obscura*, *Tabebuia obscura* var. *schultesiana*, *Tabebuia subtilis* var. *schultesiana*, *Tecoma obscura*

Handroanthus ochraceus

synonyma: *Bignonia heteropoda*, *Bignonia tomentosa*, *Tabebuia blakeana*, *Tabebuia heteropoda*, *Tabebuia hypodictyon*, *Tabebuia ochracea*, *Tabebuia ochracea* subsp. *heteropoda*, *Tecoma campinae*, *Tecoma grandiceps*, *Tecoma hassleri*, *Tecoma hemmendorffiana*, *Tecoma heteropoda*, *Tecoma hypodictyon*, *Tecoma ochracea*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Honduras, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Karibik, Kolumbie, Kostarika, Malé Antily, Panama, Paraguay, Peru, S Argentina, S Jižní Amerika, Salvador, Střední Amerika, SZ Jižní Amerika, Trinidad, V Jižní Amerika, Venezuela, Z Jižní Amerika

Roste od střední Ameriky po Argentinu v podobě poloopadavého stromu. Dorůstá výšky do 25m při průměru kmene do 50cm. Borka je mělce rýhovaná se zploštělými žebry. Větve jsou v mládí 4hranné a ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou dlanitě 5tičetné, vlastní lístky jsou vejčité, špičaté, celokrajné, dlouhé 5 - 22cm, široké 2 - 4cm a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou žluté, zvonkovité, dlouhé 4 - 8cm a cípy jsou dlouhé 2cm. Plodem je ochlupená

tobolka délky 25cm, šířky 1cm a obsahuje okřídlená semena šířky 2cm.

Vyhovují mu oblasti se suchým obdobím během roku.

Handroanthus pedicellatus

synonyma: *H. catinga*, *Tabebuia pedicellata*, *Tecoma catinga*, *Tecoma pedicellata*

Handroanthus pulcherrimus

synonyma: *Tabebuia pulcherrima*, *Tecoma petropolitana*

Handroanthus pumilus

synonyma: *Tabebuia pumila*

Handroanthus riococensis

synonyma: *Tabebuia riococensis*

Handroanthus selachidentatus

synonyma: *Tabebuia selachidentata*

Handroanthus serratifolius

synonyma: *Bignonia araliacea*, *Bignonia conspicua*, *Bignonia flavescens*, *Bignonia patrisiana*, *Bignonia serratifolia*, *Gelsemium araliaceum*, *Gelsemium speciosum*, *H. araliaceus*, *H. atractocarpus*, *H. flavescens*, *Tabebuia araliacea*, *Tabebuia flavescens*, *Tabebuia monticola*, *Tabebuia serratifolia*, *Tecoma araliacea*, *Tecoma atractocarpa*, *Tecoma conspicua*, *Tecoma nigricans*, *Tecoma patrisiana*, *Tecoma serratifolia*, *Tecoma speciosa*, *Vitex moronensis*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Francouzská Guyana, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Paraguay, S Argentina, Střední Amerika, SV Jižní Amerika, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste od střední Ameriky po Argentinu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 46m při průměru kmene 1,2 - 2,1m. Kvete žlutými květy.

Handroanthus spongiosus

synonyma: *Tabebuia spongiosa*

Handroanthus subtilis

synonyma: *Tabebuia subtilis*

Handroanthus uleanus

synonyma: *Tabebuia uleana*, *Tecoma uleana*

Handroanthus umbellatus

synonyma: *H. umbellatus* var. *lanceolatus*, *Tabebuia umbellata*, *Tabebuia umbellata* var. *lanceolata*,

Tecoma umbellata, Tecoma umbellata var. lanceolata

Handroanthus vellosi

synonyma: Bignonia longiflora, H. longiflora, Tabebuia vellosi, Tecoma alba var. subdenudata, Tecoma longiflora

Další informace:

<http://botany.cz/cs/handroanthus-ochraceus/>

<http://www.rostliny.net/>