

Handroanthus

čeleď: Bignoniaceae

Roste v latinské Americe a na jih po Argentinu, Paraguay a Čile v podobě stromu.

Handroanthus albus

synonyma: *Tabebuia alba*, *Tecoma alba*

oblasti: Bahia, Brazílie, Espírito Santo, Goiás, J Brazílie, Jižní Amerika, JV Brazílie, JZ Brazílie, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Střední Brazílie, V Brazílie, V Jižní Amerika

Roste v Brazílii.

Handroanthus arianae

synonyma: *Tabebuia arianae*

Handroanthus barbatus

synonyma: *Bignonia barbata*, *Couralia toxophora*, *Tabebuia barbata*, *Tecoma barbata*, *Tecoma toxophora*, *Zeyheria barbata*

Handroanthus billbergii

synonyma: *Tabebuia billbergii*, *Tecoma billbergii*

Handroanthus botelhensis

synonyma: *Tabebuia botelhensis*

Handroanthus bureavii

synonyma: *H. dentatus*, *Tabebuia bureavii*, *Tecoma dentata*

Handroanthus capitatus

synonyma: *Tabebuia capitata*, *Tabebuia glomerata*, *Tabebuia hypolepra*, *Tecoma capitata*, *Tecoma leucoxydon* var. *miquelii*, *Tecoma leucoxydon* var. *pentaphylla*

Handroanthus catarinensis

synonyma: *Tabebuia catarinensis*

Handroanthus chrysanthus

synonyma: *Bignonia chrysantha*, *Tabebuia chrysantha*, *Tabebuia rufescens*, *Tecoma chrysantha*, *Tecoma evenia*, *Tecoma palmeri*

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, SZ Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe v podobě stromu. Kvete pouze několik dnů žlutými květy na začátku období dešťů.

Vyhovují mu suché tropické lesy.

Handroanthus chrysotrichus

synonyma: *Gelsemium chrysotrichum*, *H. chrysotrichus* var. *obtusata*, *Tabebuia chrysotricha*, *Tabebuia chrysotricha* var. *obtusata*, *Tecoma chrysotricha*, *Tecoma chrysotricha* var. *obtusata*, *Tecoma flavescens*, *Tecoma grandis*, *Tecoma obtusata*, *Tecoma ochracea* var. *denudata*

oblasti: Brazílie, Jižní Amerika, V Jižní Amerika

Roste v Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 8 (i 20)m při průměru koruny 8 - 11m. Květy mají barvu žlutou až červenou.

Je středně odolný na sucho.

Handroanthus coralibe

synonyma: *Tabebuia coralibe*

Handroanthus cristatus

synonyma: *Tabebuia cristata*

Handroanthus guayacan

synonyma: *Tabebuia guayacan*, *Tecoma guayacan*

oblasti: Campeché, Chiapas, J Mexiko, J Severní Amerika, JV Mexiko, Mexiko, Oaxaca, Quintana Roo, Severní Amerika, Tabasco, V Mexiko, Veracruz

Roste v Mexiku.

Handroanthus heptaphyllus

synonyma: *Bignonia heptaphylla*, *H. avellanadae* var. *paullensis*, *H. eximius*, *H. impetiginosus* var. *lepidotus*, *Tabebuia avellanadae* var. *paulensis*, *Tabebuia eximia*, *Tabebuia heptaphylla*, *Tabebuia impetiginosa* var. *lepidota*, *Tabebuia ipe*, *Tecoma curialis*, *Tecoma eximia*, *Tecoma impetiginosa* var. *lepidota*, *Tecoma ipe*, *Tecoma ipe* f. *glabra*, *Tecoma ipe* f. *grandiflora*, *Tecoma ipe* f. *lepidota*, *Tecoma ipe* f. *parviflora*, *Tecoma ipe* var. *desinens*

oblasti: Brazílie, J Brazílie, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Paraguay, Paraná, Uruguay, V Jižní Amerika

Roste v Brazílii, Paraguayi a Uruguayi v podobě poloopadavého stromu. Dorůstá výšky až 40m. Borka je šedohnědá a drsná. Listy jsou vstřícné, 3četné, vlastní lístky eliptické a oboustranně špičaté. Kvete trubkovitým bělavými až růžovými květy ještě před olistěním. Plodem je čárkovitý hnědý lusk délky 30 - 40cm, šířky 1 - 1,5cm a obsahuje cca 150 okřídlených semen.

Vyskytuje se na pobřeží vodních toků.

Množ se semeny.

Handroanthus impetiginosus

synonyma: *Gelsemium avellanedae*, *H. avellanedae*, *Tabebuia avellanedae*, *Tabebuia dugandii*, *Tabebuia impetiginosa*, *Tabebuia ipe* var. *integra*, *Tabebuia nicaraguensis*, *Tabebuia palmeri*, *Tabebuia schunkevigoi*, *Tecoma adenophylla*, *Tecoma avellanedae*, *Tecoma avellanedae* var. *alba*, *Tecoma impetiginosa*, *Tecoma integra*, *Tecoma ipe* f. *leucotracha*, *Tecoma ipe* var. *integra*, *Tecoma ipe* var. *integrifolia*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, J Jižní Amerika, J Severní Amerika, Jižní Amerika, Karibik, Malé Antily, Mexiko, Paraguay, S Argentina, S Mexiko, Severní Amerika, Střední Amerika, Tobago, Trinidad, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste od Mexika po Argentinu v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky do 30m při průměru kmene do 80cm. Borka je hnědošedá. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, dlanitě 5tičetné, vlastní lístky eliptické až kopinaté, špičaté a na bázi kulaté. Kvete trubkovitými růžovými květy, vnitřní strana trubky je bílá, při vrcholu nažloutlá, cípy růžové.

Handroanthus incanus

synonyma: *Tabebuia incana*

Handroanthus lapacho

synonyma: *Tabebuia lapacho*, *Tecoma lapacho*

oblasti: Argentina, Bolívie, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, SZ Argentina, Z Jižní Amerika

Roste v Argentině a Bolívii.

Handroanthus obscurus

synonyma: *Tabebuia obscura*, *Tabebuia obscura* var. *schultesiana*, *Tabebuia subtilis* var. *schultesiana*, *Tecoma obscura*

Handroanthus ochraceus

synonyma: *Bignonia heteropoda*, *Bignonia tomentosa*, *Tabebuia blakeana*, *Tabebuia heteropoda*, *Tabebuia hypodictyon*, *Tabebuia ochracea*, *Tabebuia ochracea* subsp. *heteropoda*, *Tecoma campinae*, *Tecoma grandiceps*, *Tecoma hassleri*, *Tecoma hemmendorffiana*, *Tecoma heteropoda*, *Tecoma hypodictyon*, *Tecoma ochracea*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Honduras, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Karibik, Kolumbie, Kostarika, Malé Antily, Panama, Paraguay, Peru, S Argentina, S Jižní Amerika, Salvador, Střední Amerika, SZ Jižní Amerika, Trinidad, V Jižní Amerika, Venezuela, Z Jižní Amerika

Roste od střední Ameriky po Argentinu v podobě poloopadavého stromu. Dorůstá výšky do 25m při průměru kmene do 50cm. Borka je mělce rýhovaná se zploštělými žebry. Větve jsou v mládí 4hranné a ochlupené. Listy vyrůstají vstřícně, jsou dlanitě 5tičetné, vlastní lístky jsou vejčité, špičaté, celokrajné, dlouhé 5 - 22cm, široké 2 - 4cm a na spodní straně ochlupené. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou žluté, zvonkovité, dlouhé 4 - 8cm a cípy jsou dlouhé 2cm. Plodem je ochlupená

tobolka délky 25cm, šířky 1cm a obsahuje okřídlená semena šířky 2cm.

Vyhovují mu oblasti se suchým obdobím během roku.

Handroanthus pedicellatus

synonyma: H. catinga, Tabebuia pedicellata, Tecoma catinga, Tecoma pedicellata

Handroanthus pulcherrimus

synonyma: Tabebuia pulcherrima, Tecoma petropolitana

Handroanthus pumilus

synonyma: Tabebuia pumila

Handroanthus riocensis

synonyma: Tabebuia riocensis

Handroanthus selachidentatus

synonyma: Tabebuia selachidentata

Handroanthus serratifolius

synonyma: Bignonia araliacea, Bignonia conspicua, Bignonia flavescens, Bignonia patrisiana, Bignonia serratifolia, Gelsemium araliaceum, Gelsemium speciosum, H. araliaceus, H. atractocarpus, H. flavescens, Tabebuia araliacea, Tabebuia flavescens, Tabebuia monticola, Tabebuia serratifolia, Tecoma araliacea, Tecoma atractocarpa, Tecoma conspicua, Tecoma nigricans, Tecoma patrisiana, Tecoma serratifolia, Tecoma speciosa, Vítex moronensis

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Francouzská Guyana, J Jižní Amerika, Jižní Amerika, Paraguay, S Argentina, Střední Amerika, SV Jižní Amerika, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste od střední Ameriky po Argentinu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 46m při průměru kmene 1,2 - 2,1m. Kvete žlutými květy.

Handroanthus spongiosus

synonyma: Tabebuia spongiosa

Handroanthus subtilis

synonyma: Tabebuia subtilis

Handroanthus uleanus

synonyma: Tabebuia uleana, Tecoma uleana

Handroanthus umbellatus

synonyma: H. umbellatus var. lanceolatus, Tabebuia umbellata, Tabebuia umbellata var. lanceolata,

Tecoma umbellata, Tecoma umbellata var. lanceolata

Handroanthus vellosi

synonyma: Bignonia longiflora, H. longiflora, Tabebuia vellosi, Tecoma alba var. subdenudata, Tecoma longiflora

Další informace:

<http://botany.cz/cs/handroanthus-ochraceus/>

<http://www.rostliny.net/>