

Triplaris (Triplaris)

čeleď: Polygonaceae

Roste v Severní i Jižní Americe v podobě dvoudomého stromu. Větve bývají na řezu duté s příhrádkami. Listy jsou velké, zpravidla se 3 - 6ti podélnými párovitými pruhy a krátkými řapíky. Květenstvím je hustý latnatý hrozen nebo svazeček, listeny jsou malé, vejčité, dlouze špičaté. Plodem je 3hranná nažka. Nejznámějším druhem je

T. cumingiana

Triplaris americana

synonyma: *Ruprechtia martii*, *T. boliviana*, *T. brasiliana*, *T. estriata*, *T. euryphylla*, *T. felipensis*, *T. formicosa*, *T. guanaiensis*, *T. laxa*, *T. noli-tangere*, *T. pavonii*, *T. pyramidalis*, *T. schomburgkiana*, *T. striata*, *T. williamsii*

oblasti: Afrika, Bolívie, Brazílie, Havajské ostrovy, J Afrika, Jižní Amerika, Panama, Peru, Střední Amerika, SZ Jižní Amerika, Tichý oceán, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste od Panamy po Brazílii v podobě stromu, ale zavlčen byl i jinde. Dorůstá výšky 5 - 16 (i 30)m při průměru kmene do 30cm. Borka je šedá. Větve jsou silné. Listy jsou krátce řapíkaté, zpravidla téměř kožovité, eliptické, oboustranně špičaté, dlouhé do 40cm, široké 20cm, spodní strana je hnědá a žilnatina je hustá. Samčí květy mají délku 2mm, zatímco samičí květy jsou dlouhé do 5cm. Květní obal je za plodu dlouhý 3,5cm, z obou stran ochlupený, trubka vejčitá, vnější laloky obkopynaté, tupé, červené až růžovofialovočervené a vnitřní laloky jsou úzce kopinaté.

Triplaris caracasana

synonyma: *T. caracasana* var. *vargasii*

Triplaris cumingiana

synonyma: *T. arnottiana*, *T. auriculata*, *T. guayaquilensis*, *T. lindeniana*

oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, Karibik, Peru, Portoriko, Střední Amerika, SZ Jižní Amerika, Velké Antily

Roste v Peru v podobě stromu. Listy jsou eliptické až vejčité, zašpičatělé, mohou být řídce krátce ochlupené, dlouhé 15 - 20cm a báze může být kulatá až špičatá. Květenství je hustě ochlupené, stejně tak i obal květu s délkou 3,5cm s tupými laloky o šířce 4 - 6mm.

Vyhovují mu suché tropické lesy.

Triplaris dugandii

Triplaris efistulifera

Triplaris fulva

oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika

Roste v Peru. Listy jsou eliptické, špičaté, oboustranně ochlupené spolu s až 5cm dlouhými řapíky, báze je asymetrická, kulatá až prakticky srdčitá.

Triplaris gardneriana

synonyma: T. bonplandiana, T. guaranitica

oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika

Roste v Peru v podobě stromu. Listy jsou eliptické, oboustranně dlouze zašpičatělé, dlouhé 10 - 12,5cm, široké 4 - 7,5cm a sodní strana je drobně ochlupená. Květní obal vytváří prakticky až kulovitou ochlupenou trubku se zubatými výkrojky o délce 1,8cm, vnější laloky jsou eliptické, tupé a vnitřní čárkovité.

Triplaris longifolia

Triplaris melaenodendron

synonyma: T. macombii, T. macombii var. rufescens, Vellasquezia melaenodendron

oblasti: Ekvádor, Florida, Guatemala, J Mexiko, J Severní Amerika, Jižní Amerika, JV USA, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, S Jižní Amerika, Salvador, Severní Amerika, Střední Amerika, Střední Severní Amerika, SZ Jižní Amerika, USA

Roste od Mexika po Ekvádor a Kolumbii v podobě poloopadavého dvoudomého stromu s kulovitou korunou. Dorůstá výšky 5 - 12 (i 25)m se štíhlým kmenem. Borka je šedá až bleděhnědá a odlupuje se. Větve jsou na řezu duté s příhradkami. Palisty jsou dlouhé 2 - 3cm. Listy jsou střídavé, vejčité až eliptické, mírně asymetrické, celokrajné, špičaté, žilnaté, dlouhé 15 - 35cm, široké 6 - 18cm, žilnatinu tvoří 12 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 2cm. Samčí květy jsou seskupené v hustém latovitém hroznu s délkou 2 - 14cm, vlastní květy mají kalich délky 0,5cm s 6ti cípy, koruna zcela chybí, vytváří pouze 9 tyčinek délky 7mm, samičí květy jsou také seskupené v latovitých hroznech, ve zralosti červené, vnitřní kališní cípy jsou krátké, trubkovité, dlouhé 1 - 1,5cm, vnější mají 3 cípy délky 3 - 4,2cm, šířky 6mm v barvě hnědočervené. Plodem je 1cm dlouhá lesklá nažka s papírovitým okvětím o délce 4 - 6cm.

Vyhovují mu tropické suché lesy.

Triplaris moyobambensis

Triplaris peruviana

oblasti: Amazonas, Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Brazílie, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika

Roste v Peru a Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 16m. Větve jsou silné a holé. Listy jsou kožovité, krátce tlustě řapíkaté, eliptické, špičaté, na bázi špičaté až tupé a žilnatina je řídká. Květní obal je za plodu dlouhý 3,5cm, řídce ochlupený až prakticky holý, trubka je úzce zvonkovitá s o něco delšími úžšími cípy s tupým až zakulaceným koncem a velkým vejčitým lalokem.

Triplaris physocalyx

Triplaris poeppigiana

synonyma: *T. hispida*

oblasti: Amazonas, Bolívie, Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Brazílie, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Peru, Bolívii a Brazílii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou silné a hnědě ochlupené. Listy jsou velké, eliptické, špičaté, na bázi kulaté nebo tupé (i srdčité), žilnatina je bohatá, hustá a spodní strana je min. podél centrálního žebra ochlupená. Květenství je v mládí ochlupené, květní obal je za plodu dlouhý 5cm, trubka je ochlupené, vnější cípy čárkovitý, 2x delší trubky a vnitřní laloky jsou krátké a kopinaté.

Triplaris punctata

Triplaris purdiae

Triplaris purdiei

Triplaris setosa

Triplaris vestita

Triplaris weigeltiana

synonyma: *Blochmannia weigeltiana*, *T. martiana*, *T. martiana* var. *oblongifolia*, *T. siphonopetala*, *T. surinamensis*, *T. surinamensis* var. *benthamiana*, *T. surinamensis* var. *chamissoana*, *T. surinamensis* var. *crassifolia*, *T. vahliana*

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3836>

<http://www.rostliny.net/>