

Guazuma (Guazuma)

čeleď: Malvaceae

Roste v tropické a subtropické Americe v podobě keře nebo stromu o výšce do 30m. Stromové druhy mohou vytvářet i vyšší kořenové náběhy. Listy jsou jednoduché, 2řadé, řapíkaté, mohou být mírně kožovité, vejčité až eliptické, zubaté a na bázi zpravidla asymetrické. Květy jsou drobné, nenápadné, oboupohlavné, stopkaté, seskupené do vrcholíků, kalich tvoří 2 - 5 zpětně stočených žlutozelených laloků, koruna je 5tičetná, žlutá až růžová, korunní lístky jsou kápoité na konci s rozeklaným jazykovitým přívěskem. Vytváří 15 tyčinek rozdělených do 5ti skupin u báze srostlých do trubičky zvonkovitého tvaru. Plodem je malá dřevitá bradavičnatá či dlouze ochlupená tobolka.

Nejznámějším druhem je

G. ulmifolia

.

Vyhovují ji tropické lesy se suchou periodou.

Guazuma crinita

synonyma: *Bubroma crinitum*, *G. rosea*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Roste v Brazílii, Peru a Bolívii v podobě stromu. Větve jsou vzpřímené, kulaté a ochlupené. Listy bývají srdčitě vejčité, asymetricky pilovité, tupé, řídce ochlupené, dlouhé 10cm, široké 5cm, na spodní straně plstnaté, báze 5tinervá a řapíky jsou dlouhé do 1,2cm. Květenství je chocholičnaté až vrcholičnaté, stopkaté, vlastní květy jsou různě stopkaté, kalich je 3dílný, cípy vejčité, korunní lístky kápoité s 3mi zoubky na vrcholu a jazýčky hluboce 2dílné. Plodem je vejčitá špičatá dřevitá ochlupená tobolka.

Guazuma longipedicellata

Guazuma ulmifolia

synonyma: *Bubroma guasuma*, *Bubroma guazuma*, *Bubroma invira*, *Bubroma polybotryum*, *Bubroma tomentosum*, *Bubroma ulmifolia*, *Diuroglossum rufescens*, *G. blumei*, *G. burbroma*, *G. coriacea*, *G. guazuma*, *G. guazuma* var. *tomentosa*, *G. guazuma* var. *ulmifolia*, *G. invira*, *G. iuvira*, *G. parvifolia*, *G. polybotrya*, *G. tomentosa*, *G. tomentosa* var. *cumanensis*, *G. tomentosa* var. *monpoxensis*, *G. tomentosa* var. *parvifolia*, *G. ulmifolia* var. *glabra*, *G. ulmifolia* var. *tomentella*, *G. ulmifolia* var. *tomentosa*, *G. ulmifolia* var. *trianae*, *G. ulmifolia* var. *velutina*, *G. utilis*, *Theobroma guazuma*, *Theobroma tomentosum*

oblasti: Americké Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Argentina, Asie, Bahamy, Bolívie, Brazílie, Dominikánská Republika, Ekvádor, Galapágy, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Hispaniola, Honduras, Indie, Indočína, Indonésie, J Asie, J Jižní Amerika, J Severní Amerika, Jamajka, Jižní Amerika, JV Asie, Karibik, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Malé Antily, Malesie, Martinik, Mexiko, Montserrat, Myanmar (Barma), Nikaragua, Nizozemské Antily, Pakistán, Panama, Panenské ostrovy, Paraguay, Peru, Portoriko, S Jižní Amerika, Severní Amerika, Střední Amerika, Střední Asie, SV Argentina, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, SZ Jižní Amerika, Tichý oceán, Tobago, Trinidad, V Jižní Amerika, Velké Antily, Z Jižní Amerika

Roste od Mexika po Argentinu a v Karibiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 25 (i 30)m při průměru zpravidla zkrouceného kmene 30 - 40 (i 60)cm (často vytváří více kmenů). Listy jsou střídavé, 2řadé, eliptické až kopinaté, špičaté, jemně zubaté, tmavězelené, oboustranně ochlupené, dlouhé 6 - 13 (i 15)cm, široké 2,5 - 5 (i 6)cm, na spodní straně světlejší, báze špičatá, zkosená, 3 - 7mi dlanitěžilná a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2 (i 2,5)cm. Kvete malými 5tičetnými bleděžlutými květy s 2mm cípy, kalich je rezavě plstnatý s 3mi prakticky kulatými cípy v květenství o délce 2,5 - 5cm a vytváří se na spodní straně listu. Plody jsou prakticky kulaté, široké 2 - 4cm, hustě ostře hrbolkaté a obsahuje mnoho semen.

Množí se semeny, které rozšiřují netopýři.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/guazuma-ulmifolia/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1975>

<http://www.rostliny.net/>