

Maireana

čeleď: Chenopodiaceae

Rodové jméno bylo odvozeno od francouzského botanika jménem Charles Antoine Lemaire. Roste v Austrálii v podobě dvoudomé, oboupohlavné nebo jednopohlavné byliny, polokeře nebo keře. Listy mohou být střídavé nebo vstřícné. Kvete samostatnými nebo párovitými květy.

Maireana amoena

synonyma: Kochia amoena

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 40cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité až kulaté, ztučnělé, mohou být ochlupené a dlouhé 0,5 - 1,5cm. Kvete párovitými oboupohlavnými květy. Plod může být ochlupený, báze hranatá, uťatá a má 5 papírovitých, kožovitých nebo houbovitých křídel.

Maireana aphylla

synonyma: Kochia aphylla, Kochia villosa var. aphylla, Salsola aphylla

oblasti: Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě zpravidla trnitého a dvoudomého keře. Dorůstá výšky i šířky do 1,5 (i 2)m. Větve jsou v mládí rýhované a mírně ochlupené. Listy jsou střídavé, čárkovité až prakticky kulaté, ochlupené a dlouhé 2 - 4mm. Květy kromě báze jsou ochlupené. Plody mají v průměru 7 - 8mm, trubka je 1/2latá s 2mi žebry, v průměru má 3mm, křídla jsou zvlněná, papírovitá a v průměru mají 8mm.

Maireana appressa

synonyma: Kochia appressa, Kochia tomentosa var. appressa

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 70cm. Kmínky jsou bíle ochlupené. Listy jsou střídavé, zpravidla přitisklé, čárkovité, vejčité nebo prakticky kulaté, ochlupené a dlouhé 2 - 8mm. Kvete oboupohlavnými květy s řídko ochlupeným okvětím. Plody mají v průměru 0,9 - 1,3cm, trubka je 1/2kulatá až široce kuželovitá s průměrem 3mm, křídla jsou zvlněná a papírovitá.

Maireana astrotricha

synonyma: Kochia astrotricha, Kochia sedifolia var. stellulata

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě kulovitého keře. Dorůstá výšky 1m. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé, ztučnělé, obvejčité a dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete samostatnými ochlupenými květy. Plody jsou ochlupené, trubka obkuželovitá a křídla papírovitá s průměrem 1,5 - 2cm.

Maireana atkinsiana

synonyma: Kochia atkinsiana

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě propleteného dvoudomého keře. Dorůstá výšky do 60cm. Větve jsou řídce ochlupené. Listy jsou střídavé, seskupené do svazečků, obvejčité, ztučnělé, řídce ochlupené a dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete párovitými květy. Plody jsou růžové až červené, trubka má 10 žeber, křídla jsou vodorovná a v průměru mají až 1,8cm.

Maireana brevifolia

synonyma: Enchylaena tamariscina, Kochia brevifolia, Kochia tamariscina, Kochia thymifolia, Salsola brachyphylla, Suaeda feliciano, Suaeda tamariscina

oblasti: Afrika, Asie, Austrálie, Blízký Východ, Fuerteventura, Gran Canaria, Izrael, J Afrika, J Austrálie, Jihoafrická Republika (JAR), Jižní Austrálie, JV Austrálie, Kanárské ostrovy, Kapsko, Makaronésie, Namaqualand, Namibie, Severní Kapsko, Střední Austrálie, SZ Afrika, Viktorie, Z Asie, Z Austrálie, Západní Austrálie, Západní Kapsko

Pochází z Austrálie, ale byla zavlečená i jinam. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 0,2 - 1 (i 1,3)m. Borka je hnědá. Větve jsou v mládí řídce ochlupené, zpravidla načervenalé pruhované. Listy jsou střídavé, obvejčité až čárkovité, modrozelené, tupě špičaté, ztučnělé, na řezu kulaté, dlouhé 2 - 5mm (na nekvetoucích větvích až 1cm) a mají krátké řapíky. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy, na obalu jsou ochlupené. Plody mají v průměru 6 - 9mm, trubka je mírně 1/2kulatá, v průměru má 2mm a má 5 vějířovitých papírovitých tmavě žilkovaných křídel.

Vyhovují ji zpravidla zasolená místa.

Maireana campanulata

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Queensland, SV Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 60cm. Větve jsou zkadeřeně ochlupené. Listy jsou špičaté, ztučnělé, namodralé a dlouhé 0,8 - 1,5cm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou holé, trubka pohárkovitá, dlouhá 6mm, křídlo je papírovité a v průměru má 1cm.

Maireana cannonii

synonyma: Kochia cannonii

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě bohatě větveného keře. Listy jsou vstřícné, přisedlé, krátce ochlupené a dlouhé 5 - 6mm. Kvete samostatnými oboupohlavnými ochlupenými květy. Plody jsou zploštělé, řídce ochlupené, trubka má v průměru 2,5mm, křídlo je papírovité, kulaté a v průměru má 6mm.

Maireana carnososa

synonyma: Kochia carnososa

Maireana cheelii

synonyma: Kochia cheelii

Maireana ciliata

Maireana convexa

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě ochlupeného keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou střídavé, ztlustlé, mírně ochlupené, dlouhé 1 - 2cm a široké 1,5mm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou obkruželovité, na bázi zakulacené, dlouhé 3mm, široké 5mm, křídlo je vodorovné, papírovité a v průměru má 1,5cm.

Maireana coronata

synonyma: Kochia coronata

oblasti: Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě poléhavé až vzpřímené dřevnatějící rostliny. Dorůstá výšky 15cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, čárkovité a dlouhé 0,7 - 2cm. Kvete samostatnými oboupohlavnými ochlupenými květy, zpravidla seskupenými do klasu. Plody jsou ochlupené a křídlo je dlouhé 4mm.

Maireana decalvans

synonyma: Kochia villosa var. tenuifolia

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, SV Austrálie, V Austrálie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 40cm. Větve jsou řídce ochlupené. Listy jsou střídavé, čárkovité, na řezu kulaté, dužnaté a dlouhé 0,5 - 1,1cm. Kvete oboupohlavnými květy, kde okraje laloků mohou být ochlupené. Plody mají v průměru 0,6 - 1cm, trubka je 1/2kulatá, v průměru má 2,5 - 3mm a křídla vodorovná a plochá.

Maireana dichoptera

synonyma: Kochia dichoptera

oblasti: Austrálie, Queensland, SV Austrálie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené rostliny s dřevnatějící bází. Dorůstá výšky do 20cm. Větve jsou tenké a ochlupené. Listy jsou střídavé, čárkovité, ochlupené a dlouhé 0,7 - 2,5cm. Kvete samostatnými nebo párovými oboupohlavnými květy. Plody jsou řídce ochlupené, trubka má v průměru 2,5mm, má 6 žilek, křídel je 6, jsou vodorovná a v průměru mají 7mm.

Maireana diffusa

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou tenké a v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, obvejčité, mohou být ochlupené, dlouhé 3mm na krátkých postranních větvích a do 1,5cm dlouhé na vzpřímených větvích. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy s párem listenců o délce 0,7mm. Plody jsou holé, trubka má v průměru 2mm a mají 5 papírovitých vějířovitých křídel délky 2mm.

Maireana enchylaenoides

synonyma: *Duriala crassiloba*

Maireana eriantha

synonyma: *Kochia concava*, *Kochia eriantha*, *Kochia villosa* var. *eriantha*

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, SV Austrálie, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 50cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy mohou být vstřícné i střídavé, dužnaté, úzce eliptické, špičaté, na řezu tupě 3hranné, dlouhé 1 - 3cm a široké 1,5 - 3mm. Kvete samostatnými nebo párovitými květy v listnatém klasu. Plody jsou ochlupené, trubka obkruželovitá až pohárkovitá, křídlo kožovité a asymetricky hluboce 5tilaločné.

Maireana erioclada

synonyma: *Kochia erioclada*, *Kochia triptera* var. *erioclada*

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 60cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, obvejčité až kyjovité, dužnaté, šedé až modrozelené (i narůžovělé) a dlouhé 0,7 - 1,5cm. Kvete oboupohlavnými květy s ochlupenými okraji. Plody mají v průměru 1 - 1,3cm, okraj může být ochlupený, v mládí růžový, později hnědý, trubka obkruželovitá s průměrem 4mm, křídel 5ks, kulaté a papírovité.

Maireana eriosphaera

Maireana excavata

synonyma: *Kochia tomentosa* var. *humilis*, *Kochia villosa* var. *humilis*

Maireana georgei

synonyma: *Kochia georgei*, *Kochia stowardii*

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,15 - 0,8 (i 1)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, 1/2kulaté, ztlustlé, v mládí ochlupené a dlouhé 0,6 - 1,5cm. Kvete oboupohlavnými

květy. Plody jsou ochlupené, v průměru mají 1,4 - 2cm, trubka je obkružovitá, široká 6mm, křídla eliptická, lesklá a hnědá nebo narůžovělá.

Maireana glomerifolia

synonyma: Kochia glomerifolia

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 60cm. Větve jsou ochlupené. Listy jsou ztlustlé, ochlupené a dlouhé 1,5mm. Kvete v krátkém terminálním klasu. Plody jsou růžové až červené, křídlo 5tilaločné a v průměru má až 1,5cm.

Maireana humillima

synonyma: Kochia humillima

Maireana integra

synonyma: Kochia integra

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, SV Austrálie, V Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Větve jsou ochlupené. Listy jsou střídavé, tupé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 1,4cm a široké 1mm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou hnědé, trubka 1/2kulatá, dlouhá 1mm, široká 2,5mm a křídlo má v průměru 1cm.

Maireana lanosa

synonyma: Kochia lanosa

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, SV Austrálie, V Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou ochlupené. Listy jsou střídavé, eliptické až obvejčité, ochlupené, dlouhé 4mm (na spodních a plodících větvích až 2cm). Kvete samostatnými ochlupenými oboupohlavnými květy. Plody jsou řídce ochlupené a křídlo má v průměru 0,7 - 1,2cm.

Maireana lobiflora

synonyma: Kochia lobiflora

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě trvalky až keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou ochlupené. Listy jsou střídavé, čárkovité až eliptické a dlouhé 0,7 - 2,5cm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou ochlupené, křídlo má průměr 1cm a 5 lopatkovitých až vějířovitých laloků.

Maireana luehmannii

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě dřevnatější rostliny. Dorůstá výšky do 40cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, ztlustlé, obvejčité, ochlupené a dlouhé 5mm. Plody jsou zploštělé, trubka krátká s 10ti žebry, má 5 dřevnatých křídel délky 2 - 3mm s 2mi trnitými laloky.

Maireana marginata

synonyma: Kochia massonii

Maireana melanocarpa

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 50cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, ochlupené, zakulacené, dlouhé 3 - 5mm a široké 1mm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou hnědočerné, trubka krátce 1/2kulatá, dlouhá 1mm, široká 2mm a křídlo má šířku 6mm.

Maireana melanocoma

synonyma: Kochia melanocoma

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou slabé. Listy jsou prakticky kulaté až podlouhlé, špičaté a dlouhé 1 - 2cm. Kvete ve svazečcích a kláscích a jsou oboupohlavné. lody jsou světlezelené až žluté, křídlo je vodorovné a v průměru má 1,2 - 1,6cm.

Maireana microcarpa

synonyma: Kochia microcarpa, Kochia villosa var. microcarpa

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 40cm. Větve jsou slabé, v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, prakticky kulaté až obvejčité, ztlustlé a dlouhé 0,3 - 1cm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou hnědé, trubka pohárkovitá, mírně žebrovaná, dlouhá 1,5mm, široká 2mm a křídlo má v průměru 5 - 8mm.

Maireana microphylla

synonyma: Kochia microphylla, Kochia tomentosa f. tenuis

oblasti: Austrálie, JV Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, SV Austrálie, V Austrálie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného i rozkladitého keře. Povrch bývá mírně trnitý. Dorůstá výšky i šířky 1m. Listy bývají řídké, střídavé, prakticky kulaté, mohou být ochlupené a dlouhé 2 - 4mm. Kvete oboupohlavnými květy v listnatých klasech a na okraji jsou ochlupené. Plod má šířku 1,5 - 3mm a vrchol zploštělý nebo mírně vypouklý.

Maireana murrayana

synonyma: Kochia murrayana

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 30cm. Větve jsou ochlupené. Listy jsou střídavé, tlusté, ochlupené, eliptické až obvejčité, zakulacené, dlouhé 2cm a široké 4mm. Kvete samostatnými oboupohlavnými kulovitými ochlupenými květy. Plody mají obkuželovitou trubku délky 3 - 4mm, křídlo je vodorovné a v průměru má 2cm.

Maireana obrienii

oblasti: Austrálie, V Austrálie

Roste v Austrálii.

Maireana oppositifolia

synonyma: Kochia oppositifolia

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 80cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vstřícné až téměř vstřícné, vejčité, kýlnaté, v mládí ochlupené a dlouhé 2 - 4mm. Kvete oboupohlavnými květy s ochlupenými cípy. Plody mají v průměru 7mm, trubka je obkuželovitá, v průměru má 1,5 - 2mm, má 5 křídel (3 rozložená, 2 až vzpřímená) a vějířovitá.

Maireana ovata

synonyma: Kochia ovata

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 30cm. Větve jsou ochlupené. Listy jsou střídavé, přisedlé, vejčité až široce 3úhlé, řídce ochlupené a dlouhé 2 - 5m. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou světležluté, ochlupené, trubka 1/2kkulatá, dlouhá 1mm a křídlo mívá v průměru 4 - 6mm.

Maireana pentagona

synonyma: Kochia pentagona

Maireana pentatropis

synonyma: Kochia decipiens, Kochia ostenfeldii, Kochia pentatropis

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 60cm. Větve jsou vystoupavé, v mládí bíle ochlupené. Listy vyrůstají střídavě, jsou prakticky kulaté, ztlustlé, dlouhé 0,7 - 1,5cm a ve stáří

černají. Kvete oboupohlavnými květy s ochlupenými okraji cípů. Plody mají v průměru 0,8 - 1,2cm, trubka je obkuželovitá, v průměru má 3mm a má 3 - 5 vějířovitých až kruhových svislých křídel.

Maireana planifolia

synonyma: Kochia planifolia, Kochia tomentosa var. platyphylla

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě řídké větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Větve jsou slabé a ochlupené. Listy jsou vstřícné, zploštělé, obvejčité, tupé, ochlupené, dlouhé (0,5 -) 0,8 - 1,5cm. Kvete samostatnými nebo párovými oboupohlavnými květy. Plody mají široce obkuželovitou trubku, křídlo průsvitné a v průměru má 1 - 1,4cm.

Maireana platycarpa

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky do 60cm. Větve jsou ochlupené. Listy bývají vstřícné, čárkovité až 1/2kulaté či člunkovité, tupé až špičaté, přisedlé a dlouhé 0,7 - 1,2cm. Kvete samostatnými oboupohlavnými ochlupenými květy. Plody jsou zploštělé, trubka má v průměru 4 - 6mm, křídla jsou tenká a v průměru mají 1,5 - 2,3cm.

Maireana polypterygia

synonyma: Kochia polypterygia

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě zpravidla dvoudomého keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, 1/2kulaté až lopatkovité, ochlupené a dlouhé 0,8 - 1,5cm. Kvete samostatnými květy. Plody má pohárkovitou trubku délky 1,4mm, křídlo vodorovné, kulaté, v průměru má 0,7 - 1,7cm, na vrcholu s několika nevyvinutými svislými křídly.

Maireana prosthecochaeta

synonyma: Kochia prosthecochaeta

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 60cm. Větve jsou vzpřímené, mírně dužnaté. Listy jsou bohaté, střídavé, ztlustlé, 1/2kulaté, špičaté, zelené, dlouhé do 4cm a široké 2 - 3mm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou tmavěhnědé, trubka obkuželovitá, dlouhá 5mm, široká 4mm a křídlo má v průměru 1,5cm.

Maireana pyramidata

synonyma: Kochia lobostoma, Kochia pyramidata, Kochia pyramidata var. lobostoma

Maireana radiata

synonyma: Kochia radiata

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 80cm. Kmínky jsou ochlupené. Listy vyrůstají střídavě, jsou vejčité, ztlustlé, zkadeřeně ochlupené a dlouhé 2 - 4mm. Kvete oboupohlavními květy (i v klasech). Plody jsou ochlupené, v průměru mají 4 - 6mm, trubka je 1/2kulatá až obkuželovitá o průměru 1,5mm a křídla jsou vodorovná.

Maireana rohrlachii

synonyma: Kochia rohrlachii

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou střídavé, čárkovité až vejčité či obvejčité, ztlustlé, v mládí řídce ochlupené a dlouhé 2 - 8mm. Kvete oboupohlavními květy s ochlupenými okraji. Plody mají v průměru 1,1 - 1,6cm, trubka je uťatá, obkuželovitá s průměrem 4mm a křídla zpravidla zvlňená.

Maireana schistocarpa

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, SV Austrálie, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kulaté, ztlustlé, špičaté a dlouhé 0,4 - 1,2cm. Kvete samostatnými oboupohlavními ochlupenými květy. Plody jsou ochlupené, trubka obkuželovitá, dlouhá 2mm, křídlo je prakticky vodorovné a v průměru má 1,2 - 1,5cm.

Maireana scleroptera

synonyma: Kochia scleroptera

Maireana sedifolia

synonyma: Kochia sedifolia

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě dvoudomého keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, kyjovitě ztlustlé či obvejčité a dlouhé 4 - 9mm. Kvete párovými ochlupenými květy, samčí jsou 1/2kulaté a samičí kulaté. Plody mají v průměru 1 - 1,3cm, jsou ochlupené, bleděhnědé, trubka 1/2kulatá až obkuželovitá s průměrem 2 - 3mm, křídla kulovitá a okraj vykousávaný.

Maireana spongiocarpa

synonyma: Kochia spongiocarpa

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 30cm. Větve jsou slabé a zkadeřeně ochlupené. Listy jsou střídavé, ztlustlé, kulaté až eliptické, špičaté, tmavězelené a dlouhé 0,8 - 1,5cm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy s ochlupenými okraji laloků. Plody jsou tmavěhnědé, trubka dlouhá 8mm a křídlo má v průměru 1,2 - 1,5cm.

Maireana stipitata

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou ochlupené. Listy jsou střídavé, ztlustlé, tupé, řídce ochlupené a dlouhé 0,6 - 1cm. Kvete samostatnými jednopohlavnými nebo oboupohlavnými květy. Plody mají široce obkruželovitou trubku délky 0,5 - 1mm a křídlo má v průměru 1 - 1,4cm.

Maireana suaedifolia

synonyma: Kochia suaedifolia

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 50cm. Větve jsou slabé a namodralé. Listy jsou střídavé, ztlustlé, na plodících větvích eliptické, dlouhé 5mm a na hlavních větvích dlouhé do 2,5cm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou holé, trubka krátce 1/2kulatá, v průměru má 3mm a křídlo má v průměru 0,8 - 1,2cm.

Maireana thesioides

synonyma: Kochia thesioides

oblasti: Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výška 1m. Listy jsou střídavé, eliptické, ztlustlé a dlouhé 0,5 - 1,5cm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou holé, trubka obkruželovitá, dlouhá 3mm, křídlo je vodorovné a v průměru má 1 - 1,5cm.

Maireana tomentosa

synonyma: Kochia enchylaenoides, Kochia tomentosa var. enchylaenoides

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou ochlupené. Listy jsou ztlustlé, ochlupené, kulaté a dlouhé 5 - 8mm. Kvete samostatnými oboupohlavnými květy. Plody jsou holé, lesklé, trubka pohárkovitá, hladká, dřevitá, dlouhá 1 - 1,5mm, široká 2mm a křídlo má v průměru 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

-
- subsp. tomentosa/Kochia tomentosa var. enchylaenoides
 - listy tupé až zašpičatělé, ochlupené
-
- subsp. urceolata

- listy zakulacené, řídce ochlupené

Maireana trichoptera

synonyma: *Kochia excavata* var. *trichoptera*, *Kochia villosa* var. *lasioptera*

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Nový Jižní Wales, V Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, 1/2kulaté až úzce kyjovité, ztlustlé, ochlupené a dlouhé 0,5 - 1,2cm. Kvete oboupohlavnými květy zpravidla v ochlupeném klasu. Plody mají v průměru 1 - 1,2cm, jsou ochlupené, trubka obkruželovitá, široká 2 - 3,5mm a křídlo je kulaté.

Maireana triptera

synonyma: *Kochia triptera*

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii v podobě namodralého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou v úžlabí ochlupené. Listy jsou prakticky kulaté, střídavé, ztlustlé a dlouhé 0,7 - 2cm. Kvete zpravidla oboupohlavnými květy s ochlupenými cípy. Plody mají v průměru 0,8 - 1cm, trubka je 1/2kulatá, v průměru má 3mm a má 3 (- 5) kulatých svislých křídel šířky do 3mm.

Maireana turbinata

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, JV Austrálie, Queensland, SV Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, 1/2kulaté, ztlustlé, zpravidla namodralé, ochlupené a dlouhé 3 - 8mm. Kvete oboupohlavnými květy s ochlupenými laloky. Plody mají v průměru 1,4 - 2cm, laloky jsou na okraji chlupaté, trubka je obkruželovitá, široká 5mm, křídla jsou eliptická nebo kulatá, zvlněná, lesklá a hnědá (i narůžovělá).

Maireana villosa

synonyma: *Kochia tomentosa* var. *lindleyana*

oblasti: Austrálie, J Austrálie, Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, SV Austrálie, V Austrálie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou slabé a ochlupené. Listy jsou střídavé, zploštělé, čárkovité až obvejčité, špičaté, ochlupené a dlouhé 0,5 - 1,2cm. Kvete samostatnými nebo párovitými oboupohlavnými květy. Plody jsou hnědé, trubka obkruželovitá a křídlo má v průměru 0,7 - 1cm.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/maireana-brevifolia/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2469>

<http://www.rostliny.net/>