

Reichardia

čeleď: Asteraceae

Roste ve středozeší a západní Asii. Rodové jméno bylo vybráno na počest německého botanika Johanna J. Reicharda.

Reichardia baetica

Reichardia canariensis

oblasti: Makaronésie

Reichardia crystallina

Reichardia dichotoma

Reichardia famarae

Reichardia gaditana

oblasti: Andalusie

Patří mezi dvouletky. Dorůstá výšky 15 - 60cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou peřenolaločné až peřenosečné. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 1,5 - 2cm. Plodem je nažka délky 2 - 3mm s chmýrem délky 1 - 1,4cm.

Reichardia glauca

oblasti: Írán

Reichardia intermedia

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Itálie, Izrael, Kréta, Kypr, Libanon, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sicílie, Tunisko, Turecko

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 5 - 60cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou peřenosečné až peřenolaločné. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 1 - 1,5cm. Plodem je eliptická nažka délky 2,5 - 3mm s chmýrem délky 0,8 - 1cm.

Reichardia ligulata

oblasti: Makaronésie

Roste na Kanárských ostrovech Tenerife, Gran Canaria a La Palma. Dorůstá výšky do 50cm. Stonek u báze dřevnatí. Listy vytvářejí přízemní růžici, bývají laločnaté, kopinaté, kožovité, ochlupené, sivozelené, zvlněné, max. krátce řapíkaté a zpeřené. Květní stonek je větvený, květenstvím je žlutý úbor, zákrovní listeny jsou střechovité, zákrov je široký 1,8 - 2cm, listeny jsou kratší než 0,5mm, okvětní lístky jsou podlouhlé, žluté, na konci roztřepené. Plodem je 4hranná rýhovaná nažka s chmýrem.

Vyhovují ji štěrkovitá místa.

Reichardia picroides

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Havajské ostrovy, Itálie, JZ Austrálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Sýrie, Tunisko

Roste ve středozeší od Portugalska po Turecko včetně ostrovů a zavlečen byl třeba do Austrálie a na Havajské ostrovy. Roste jako trvalka. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 60 (i 70)cm. Vytváří přízemní listovou růžici, kde jsou listy zubaté, kopinaté, laločnaté až vykrojené, šedozelené, lodyžní jsou zakrnělé, přisedlé a kopinaté. Lodyha je větvená, nese žlutý úbor, zákrovní listeny jsou střechovité s přívěškem na špičce. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 1,1 - 1,5cm. Plodem je 4hranná rýhovaná nažka délky 2,5 - 3,3mm s chmýrem délky 8 - 9,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. intermedia
- subsp. picroides

Vyhovuje mu pobřeží, pláže, skaliska atp.

Reichardia tingitana

oblasti: Andalusie, Austrálie, Havajské ostrovy, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Makaronésie, Středozeší, SV Afrika, SZ Indie

Pochází ze středozeší, Makaronésie, severovýchodní Afriky a jihozápadní Asie. Zavlečená byla do Austrálie a Tichomoří. Roste jako jednoletka nebo krátkověká trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 35 (i 60)cm. Stonek je přímý. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou obkopinaté, zpravidla zpeřené, dužnaté, mohou být ochlupené, šedozelené, zubaté, dlouhé 2 - 14cm, široké 0,7 - 4cm, lodyžní jsou zpravidla zakrnělé, přisedlé a kopinaté. Květenstvím je terminální samostatný úbor, zákrov má délku 0,9 - 1,5cm, vnější zákrovní listeny jsou vejčité, vnitřní kopinaté, okvětní lístky žluté, zpravidla s růžovofialovou bází. Plodem je nažka délky 1,5 - 2,2mm s chmýrem délky 7 - 8,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. mauritii
- var. pinnatifida

Vyhovují mu duny a jiná písčité místa.

Reichardia x sventenia

Další informace:

<https://botany.cz/cs/reichardia-picroides/>

<https://www.rostliny.net/>