

Salpichroa

čeleď: Solanaceae

Roste v podobě popínavé trvalky nebo keře. Listy jsou střídavé nebo vstřícné, párovité anebo v 3četných přeslenech, jsou jednoduché, vejčité, mírně srdčité (i kopinaté). Květy samostatnými úžlabními květy, kalich má 5 laloků a koruna také 5. Plodem je zpravidla červená (i bledězelená) bobule obsahující zploštělá semena.

Salpichroa ciliata

Salpichroa dependens

oblasti: Peru

Roste v Peru. Kmínky jsou převislé a dlouhé 3 - 5m. Listy jsou párovité, srdčité vejčité, mírně lepivé, dlouhé 2,5cm, široké 1,5cm a řapíky jsou dlouhé 7 - 9mm. Květy mají 0,8 - 1,2cm stopku, kalich trubkovitý, ochlupený, mírně lepivý, 5třílůň, dlouhý 2,5cm, koruna trubkovitá, dlouhá více než 2,2cm, laloky jsou vejčitěkopinaté a dlouhé 1,2cm.

Salpichroa didierana

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě liány. Dorůstá délky pouze 2m při průměru u báze 2cm. Listy jsou střídavé, vrcholové prakticky vstřícné, kopinaté, mírně drsné, špičaté a na bázi prakticky zakulacené. Květy jsou krátce stopkovité, kališní cípy čárkovité, ochlupené, dlouhé 2,5cm, květy převislé, žluté, dlouze nálevkovité, dlouhé 12 - 13cm a korunní laloky špičaté. Plodem je kuželovitá tobolka obsahující ledvinitá semena.

Salpichroa diffusa

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v Peru, Ekvádoru a Kolumbii v podobě pružného rozkladitého keře. Větve jsou křídlaté. Listy jsou párovité, vejčité, přišpičaté, oboustranně jemně ochlupené, dlouhé 1,8cm, široké 1 - 1,4cm, báze tupá a řapíky jsou dlouhé 8mm. Květy mají kalich délky 6mm, laloky čárkovité, ochlupené, koruna ochlupená, nálevkovitá, trubka dlouhá 1,2cm s 4mm okrajem a laloky jsou podlouhlé. Plody jsou aromatické.

Salpichroa gayi

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě šplhavé rostliny. Větve jsou v mládí ochlupené, později jednostranně

křídlaté. Listy jsou párovité, podlouhlé až mírně 3úhlé, řídce ochlupené, dlouhé 1,4 - 1,6cm, široké 1 - 1,2cm, báze tupá až prakticky srdčitá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 7 - 9mm. Květy mají 3 - 4mm stopku, kališní lístky čárkovité, špičaté, dlouhé 4mm, koruna jemně ochlupená, dlouhá 1,2cm, laloky kopinaté a dlouhé 4mm.

Salpichroa glandulosa

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě rozkladitého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky min. 1m. Listy jsou párovité, srdčité, dlouhé 1 - 3,5cm, široké 0,8 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květy mají 6 - 8mm stopku, jsou žlutozelené, trubkovité, kališní cípy prakticky čárkovité, ochlupené, dlouhé 0,8 - 1,5cm, koruna v jícnu široká 1 - 1,5cm a laloky jsou vejčité a dlouhé 8mm. Plodem je zelenobílá bobule délky 3cm a šířky 1,5cm.

Salpichroa hirsuta

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě ochlupeného keře. Listy jsou párovité nebo ve svazečcích, vejčité, špičaté, dlouhé do 5cm, široké 2cm, báze tupá a řapíky jsou dlouhé do 3cm. Květy mají 8mm dlouhý kalich, laloky ochlupené, čárkovité, koruna ochlupená, nálevkovitá, trubka tenká, dlouhá 3cm, laloky vejčité a dlouhé 3mm. Plody jsou dlouhé 1,5cm a široké 8mm.

Salpichroa micrantha

oblasti: Peru

Roste v Peru. Listy jsou vejčité, 3úhlé, mírně asymetrické, tupé, dlouhé 1,5 - 1,7cm, široké 1,1 - 1,4cm, báze tupá až mírně srdčitá a řapíky dlouhé 1,1 - 1,2cm. Květy mají 2 - 2,5mm stopku, kalich má délku 4mm, kališní lístky z 1/3 srostlé, zbytek kopinatý a špičatý, koruna má délku 8 - 9mm a trubka má 1,5mm dlouhé laloky.

Salpichroa microloba

Salpichroa microphylla

Salpichroa organifolia

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Florida, Georgia, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Nové Mexiko, Severní Karolína, Středozeří, Texas, Virginie

Roste v Jižní Americe. Lodyha je pružná, hranatá, ochlupená a na bázi dřevitá. Listy jsou kosočtvercovité až kulaté, řídce ochlupené, dlouhé 1,5 - 2,5 (i 5)cm, široké 1 - 2 (i 4)cm a báze splývavá s řapíkem. Květy mají kalich délky 3 - 4mm, je rozeklaný prakticky až k bázi, laloky šídlovité, koruna dlouhá 0,6 - 1cm a bělavá. Plody jsou vejčité, světleběžové, jedlé, dlouhé 1 - 2cm a obsahují ochlupená semena délky 1,5 - 2mm.

Pochází z oblastí blízkým vodním tokům s dostatkem živin.

Salpichroa proboscidea

Salpichroa ramosissima

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Větve jsou 4hranné, v mládí ochlupené. Listy vyrůstají v párech anebo v 3četných přeslenech, jsou eliptické, zašpičatělé, ochlupené, dlouhé 4cm, široké 1,5 - 2cm, báze zakulacená, sbíhavá a řapík je dlouhý 1,2cm. Květy mají cípy čárkovité, mírně ochlupené, koruna trubkovitá, laloky zašpičatělé a jemně ochlupené. Plodem je červená eliptická tobola délky 2cm a šířky 1,2cm.

Salpichroa scandens

Salpichroa tristis

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Ekvádoru v podobě rozkladitého keře. Větvičky jsou krátké, dlouhé do 2,5cm. Listy jsou párovité, žláznatě ochlupené, obvejčité, dlouhé do 6mm a řapíky zploštělé, dlouhé 3mm. Květy převíslé, dlouhé 1cm, kalich 5tídlitý, laloky šídlovité, dlouhé 4mm, korunní trubka dlouhá 1cm, široká 3mm, laloky krátké a 3úhlé.

Salpichroa weberbaueri

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Větve jsou šplhavé. Listy má vejčitěsrdčité, ochlupené, dlouhé a téměř stejně široké 1,5 - 3cm. Květy mají 8mm stopku, kalich mírně ochlupený, dlouhý 1cm, koruna trubkovitá, žlutá, dlouhá 3,5cm, laloky vejčité, špičaté a dlouhé 3mm.

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2991>

<https://www.rostliny.net/>