

Klasea (Srpice)

synonyma: Schumeria

čeleď: Asteraceae

Roste v Euroasii a severní Africe. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Klasea alcalae

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 10 - 50cm. Listy jsou střídavé. Květenství je dlouhé 3 - 4,5cm a široké 2 - 2,5cm. Plodem je nažka délky 4 - 6mm s chmýrem délky 1,7 - 2,5cm.

Klasea algarbiensis

synonyma: K. integrifolia subsp. algarbiensis, K. monardii subsp. algarbiensis, Serratula monardii var. algarbiensis

Klasea aphyllopoda

synonyma: Serratula aphyllopoda

Klasea aznavouriana

synonyma: Serratula aznavouriana

Klasea baetica

synonyma: Serratula baetica, Serratula baetica subsp. baetica, Serratula baetica var. baetica, Serratula boetica

oblasti: Andalusie, SZ Afrika, Z Středozeří

Roste v západním středozeří. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 90)cm. Lodyha je přímá, občas je v horní části větvená a může být ochlupená. Přízemní listy vytvářejí růžici, jsou řapíkaté, eliptické až kopinaté, zubaté až peřenodílné, dlouhé do 35cm, široké 7cm, lodyžní jsou střídavé, přisedlé, čárkovité až podlouhlé, celokrajné nebo peřenodílné a mohou být ochlupené. Květenstvím je zpravidla samostatné, dlouhé 2,8 - 3cm, široké 1,8 - 3,5cm, zákrov vejčitý, dlouhý 1,5 - 4cm, široký 1 - 2,5cm, listeny jsou v 5 - 7 (i 8)mi řadách, jsou kopinaté, vnější zelené, vnitřní načervenalé, mohou být ochlupené, mohou mít až 1,4cm špičku, trubkovité květy jsou oboupohlavné, dlouhé 2 - 3 (i 3,5)cm v barvě růžové až růžovofialové s 5ti čárkovitými cípy. Plodem je nažka délky 4 - 7mm s chmýrem délky 1,8 - 2cm.

Vyhovují ji xerofilní křoviny.

Klasea biebersteiniana

synonyma: K. radiata subsp. biebersteiniana, Serratula biebersteiniana, Serratula radiata subsp. biebersteiniana

Klasea bornmuelleri

synonyma: Schumeria bornmuelleri, Serratula bornmuelleri

Klasea bulgarica

synonyma: Serratula bulgarica, Serratula caput-najae

oblasti: Bulharsko

Klasea calcarea

synonyma: Serratula calcarea

Klasea cardunculus

synonyma: Centaurea cardunculus, Centaurea uniflora, K. laxmannii, Serratula cardunculus, Serratula marilandica, Serratula nitida, Serratula nitida var. nitida

Klasea caucasica

oblasti: Kavkaz

Klasea centauroides

synonyma: K. centauroides var. centauroides, K. komamvii, K. mongolica, K. yamatsutana, Serratula centauroides, Serratula centauroides var. centauroides, Serratula centauroides var. macrocephala, Serratula mongolica, Serratula yamatsutana var. mongolica, Serratula yamatsutana var. yamatsutana

Klasea cerinthifolia

synonyma: Centaurea behen, Centaurea cerinthifolia, Microlophus cerinthifolius, Schumeria cerinthifolia, Serratula behen, Serratula cerinthifolia, Serratula cordata

oblasti: Izrael

Klasea chartacea

synonyma: Serratula chartacea

Klasea coriacea

synonyma: Centaurea strictissima, Serratula coriacea

Klasea cretica

synonyma: *K. flavescens* subsp. *cretica*, *Serratula cichoracea* subsp. *cretica*

oblasti: Kréta

Klasea dissecta

synonyma: *Serratula angulata*, *Serratula dissecta*, *Serratula dissecta* var. *angulata*, *Serratula dissecta* var. *dissecta*

Klasea erucifolia

synonyma: *Carduus xeranthemoides*, *Centaurea erucifolia*, *Centaurea radiata*, *Serratula erucifolia*, *Serratula xeranthemoides*, *Xeranthemum erucifolium*, *Xeranthemum pungens*

Klasea flavescens

synonyma: *Cnicus javescens*, *Serratula flavescens* subsp. *flavescens*, *Serratula flavescens* var. *flavescens*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky 15 - 80 (i 90)cm. Listy jsou střídavé. Květenství je dlouhé 2,4 - 4cm, široké 1,3 - 3cm. Plodem je nažka délky 5 - 7mm s chmýrem délky 1 - 1,4 (i 1,6)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cichoracea* - endemit Itálie
- subsp. *flavescens*
- subsp. *leucantha*
- subsp. *mucronata*
- subsp. *neglecta*

Klasea gracillima

synonyma: *Serratula gracillima*

Klasea grandifolia

synonyma: *Serratula grandifolia*

oblasti: Írán

Klasea hakkiarica

synonyma: *Serratula hakkiarica*

Klasea hastifolia

synonyma: *Serratula hastifolia*

Klasea haussknechtii

synonyma: *Serratula haussknechtii*, *Serratula nudicaulis* subsp. *transcaucasica*, *Serratula nudicaulis*

var. transcaucasica, *Serratula transcaucasica*

oblasti: Írán

Klasea ibrahimii

Klasea integrifolia

synonyma: *K. monardii* subsp. *monardii*, *Serratula monardii* f. *monardii*, *Serratula monardii* var. *monardii*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 10 - 25cm. Listy jsou střídavé. Květenství je dlouhé 3,5 - 4cm a široké 2,5 - 3,5cm. Plodem je nažka délky 6 - 7mm s chmýrem délky 1,5 - 2,2cm.

Klasea khorasanica

Klasea khuzistanica

synonyma: *Centaurea khuzistanica*, *Serratula khuzistanica*

Klasea kotschy

synonyma: *Serratula kotschy*

Klasea kurdica

synonyma: *Schumeria kurdica*, *Serratula kurdica*

Klasea lasiocephala

synonyma: *Serratula lasiocephala*

Klasea latifolia

synonyma: *Schumeria latifolia*, *Serratula latifolia*

Klasea legionensis

synonyma: *Serratula legionensis*

Klasea leptoclada

synonyma: *Jurinea leptoclada*, *Nikitinia leptoclada*

Klasea litwinowii

synonyma: *Schumeria litwinowii*, *Serratula litwinowii*

Klasea lycopifolia (Srpice karbincolistá)

synonyma: *Carduus hyssopifolius*, *Carduus lycopifolius*, *Carduus nitidus*, *K. heterophylla*, *Serratula kitaibelii*, *Serratula lycopifolia*, *Serratula nitida*

oblasti: Chorvatsko, Česká republika, Francie, J Rusko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Střední Itálie, Ukrajina

Roste od jižního Ruska po Francii a Itálii jako trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2m. Pod zemí vytváří silný oddenek. Lodyha je přímá a nevětvená a olistěná pouze ve spodní 1/2. Listy jsou lesklé, přízemní široce vejčité, hrubě pilovité, výše položené jsou laločnatě zubaté až lyrovitě peřenolaločné. Kvete v jediném úboru na dlouhé stopce, v průměru má 2 - 3cm, zákrov je zvonkovitý, listeny střežovité, vnější vejčité, vnitřní čárkovitá a koruna je fialová. Plodem je nažka délky 4 - 5mm s bělavým chmýrem. Patří mezi vzácné druhy C2r.

Vyhovují mu travnaté až křovinaté svahy, lesostepi (i slatiny) na plném slunci.

Klasea lyratifolia

synonyma: *Serratula lyratifolia*, *Serratula modestii*, *Serratula tianschanica*

Klasea marginata

synonyma: *Carduus altaicus*, *Carduus uniflorus*, *K. algida*, *K. glauca*, *Serratula algida*, *Serratula dshungarica*, *Serratula gelberifolia*, *Serratula glauca*, *Serratula laxmannii*, *Serratula marginata*, *Serratula nitida* var. *glauca*

Klasea melanocheila

synonyma: *Serratula melanocheila*

Klasea mongolicola

Klasea moreana

Klasea mouterdei

synonyma: *Serratula mouterdei*, ×*Centauserratula mouterdei*

Klasea nana

Klasea nishimurae

Klasea nudicaulis

synonyma: *Calcitrapa nudicaulis*, *Carduus cerinthifolius*, *Carduus cerinthoides*, *Carduus glaucus*, *Carduus nudicaulis*, *Centaurea dornacina*, *Centaurea nudicaulis*, *Serratula albarracinensis*, *Serratula glauca*, *Serratula nudicaulis*, *Serratula nudicaulis* subsp. *demissa*, *Serratula nudicaulis* subsp. *nudicaulis*, *Serratula nudicaulis* subsp. *subinermis*, *Serratula nudicaulis* var. *albarracinensis*, *Serratula nudicaulis* var. *ibrahimi*, *Serratula nudicaulis* var. *nudicaulis*, *Serratula nudicaulis* var.

subinermis, *Serratula nudicaulis* var. *transiens*

oblasti: Andalusie, Francie, Itálie, Katalánsko, Maroko, Švýcarsko, Z Středozeří

Roste v západním středozeří jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky (10 -) 30 - 50 (i 60)cm. Lodyha je přímá a nevětvená. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, vejčitě kopinaté, zubaté, špičaté, dlouhé 10 - 17cm, široké 5 - 7cm, lodyžní jsou střídavé a drobné. Květenstvím je úbor o průměru 2 - 3cm, zákrov je 1/2kulatý, listeny 3úhlé zakončené tmavým přívěškem, trubkovité květy jsou oboupohlavné s nálevkovitou červenofialovou korunou. Plodem je nažka délky 3 - 4,5mm s chmýrem délky 0,9 - 1,1cm.

Vyhovují mu suché horsky laděné louky zejména s vápencovým základem.

Klasea oligocephala

synonyma: *Serratula oligocephala*

Klasea pallida

synonyma: *Serratula pallida*

oblasti: Ázád Kašmír, Himáčalpradéš, Kašmír, Nepál, Paňdžáb (pakistaný), Uttarpradéš

Roste v Pákistánu, Indii a Nepálu v podobě vzpřímené nevětvené trvalky. Povrch je ochlupený. Listy jsou tenké, zelené, na spodní straně světle zelené, při okraji ochlupené, přízemní a spodní řapíkaté, lyrovitě peřenoklané, ostře zubaté, dlouhé do 20cm, široké do 12cm, laloky špičaté, střední lodyžní listy jsou menší, asymetricky peřenoklané až peřnosečné, vrcholové laloky špičaté, horní listy bývají úzce kopinaté, přisedlé a celokrajné. Květenstvím je vrcholový úbor o průměru 2,5 - 3,5cm na až 40cm stopce, zákrov má délku 2 - 2,5cm, je ochlupený, několikařadý, vnější zákrovní lístky jsou vejčitě až kopinaté, zašpičaté, střední široké 3 - 4mm, koruna je růžově bílá, dlouze zvonkovitá, dlouhá 1,8 - 2cm a okvětní lístky jsou dlouhé 5 - 6mm. Plodem je světlá podlouhlá až úže obvejčitá nažka délky 5mm s nahnědlým chmýrem délky 8mm.

Klasea paradoxa

synonyma: *Centaurea paradoxa*

Klasea pinnatifida

synonyma: *Carduus pinnatifidus*, *Centaurea barrelieri*, *Cirsium pinnatifidum*, *Cnicus pinnatifidus*, *Serratula barrelieri*, *Serratula pinnatifida*

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 6 - 45cm. Listy jsou střídavé. Květenství je dlouhé 2,3 - 4 (i 4,5)cm a široké 1,2 - 2,5 (i 3)cm. Plodem je nažka délky 5 - 8mm s chmýrem délky 1,7 - 3cm.

Klasea procumbens

synonyma: *Jurinea paulsenii*, *Serratula flexicaulis*, *Serratula procumbens*

oblasti: Afganistán, Pákistán, Pamír, Tádžikistán, Ťan-šan, Xinjiang

Roste v Ťan-šanu, Afganistánu, Pákistánu, Tádžikistánu, Pamíru a Číně v podobě vystoupavé trvalky. Pod zemí vytváří vodorovný jednohlavý oddenek. Listy jsou na bázi v růžici, krátce řapíkaté, úzce vejčité až kopinaté či obkopinaté, zašpičatělé, asymetricky pilovité, oboustranně řídce ochlupené, dlouhé 4 - 6 (i 8)cm, široké 1 - 2cm, lodyžní jsou špičaté, celokrajné, dlouhé 2 - 4 (i 5)cm a široké 0,8 - 1,5cm. Květenstvím je úbor průměru 2 - 3cm, zákrov je 5tiřadý, úzce zvonkovitý, světle zelený až světle hnědý, na vrcholu ostnitý, dlouhý 1,8 - 2 (i 2,2)cm, vnější zákrovní lístky 3úhle vejčité, dlouhé 2 - 3mm, na okrajích ochlupené, střední vejčité, dlouhé 3 - 4mm, vnitřní úzce podlouhlé, dlouhé 4 - 5mm, koruna má délku 2,5 - 2,8cm, okvětní lístky růžové až růžově fialové a dlouhé 7 - 8mm. Plodem je nažka délky 5mm s několikařadým chmýrem délky 1,2 - 1,5cm.

Klasea pusilla

synonyma: *Cynara pusilla*, *Rhaponticum pusillum*, *Serratula pusilla*

oblasti: Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýrie, V Středozeří

Roste ve východním středozeří v Libanonu, Sýrii, Izraeli a Jordánsku.

Vyhovuje ji polostep a křoviny.

Klasea quinquefolia

synonyma: *Carduus quinquefolius*, *Serratula quinquefolia*

oblasti: Írán, Kavkaz

Patří mezi endemity Kavkazu.

Klasea radiata

synonyma: *Carduus radiatus*, *Serratula hungarica*, *Serratula radiata*, *Serratula radiata* subsp. *bractifolia*, *Serratula radiata* subsp. *radiata*

oblasti: Írán, Itálie

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *biebersteiniana*

Klasea rugosa

Klasea sanandajensis

Klasea serratuloides

Klasea sogdiana

synonyma: *Serratula alata*, *Serratula dissecta* var. *asperula*, *Serratula sogdiana*, *Serratula trautvetteriana*

Klasea suffruticulosa

synonyma: Serratula ajdarovae, Serratula suffruticosa

Klasea suffulta

synonyma: Serratula suffulta

Klasea turkica

Klasea viciifolia

synonyma: Schumeria viciifolia, Serratula viciifolia

Klasea yunus-emrei

Klasea ×bogdensis

Další informace:

<https://botany.cz/cs/serratula-lycopifolia/>

<https://www.rostliny.net/>