

Disphyma

čeleď: Aizoaceae

Roste v JAR, Austrálii a Novém Zélandu v podobě sukulentního keře nebo jednoletky. Dorůstá výšky 2 - 30cm. Listy jsou na průřezu kulaté. Kvete růžovými až fialovými květy.

Disphyma australe

oblasti: Austrálie, Chathamské ostrovy, J Austrálie, J Nový Zéland, Kermadekovy ostrovy, Nový Zéland, S Nový Zéland, Stewart Island (Rakiura), Three Kings Islands, Tichý oceán

Roste na Severním i Jižním ostrově Nového Zélandu a na jihu Austrálie. Patří mezi trvalky. Lodyha je plazivá, dlouhá i více než 1m. Listy vyrůstají vstřícně, jsou čárkovité až eliptické, zakulaceně 3boké, na vrcholu špičaté, zpravidla i hrotité, dlouhé 0,5 - 4cm, široké 4 - 9mm a báze klínovitá. Květy mají tlustou stopku délky 1 - 4cm, průměr 2 - 4cm, kalich je dužnatý, 5ticípý (2 cípy menší), korunní lístky jsou bílé až tmavěružové, vyrůstají v 3 - 5ti řadách a mají délku 1 - 3cm. Plodem je dužnatá tobolka obsahující hnědá semena délky 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

-
subsp. australe

-
subsp. stricticaule

- Kermadekovy ostrovy; krátké vzpřímené výhony, listy s kalichem bradavičnaté

Vyhovují mu pobřežní skály, štěrk, písčité duny (i slané mokřiny). Může se nalézt i na vápencových či pískovcových srážech.

Disphyma clavellatum

synonyma: *D. blackii*, *D. crassifolium* subsp. *clavellatum*

Disphyma crassifolium

synonyma: *Mesembryanthemum clavellatum*, *Mesembryanthemum crassifolium*

oblasti: Andalusie, Austrálie, Evropa, Iberský poloostrov, J Austrálie, J Španělsko, Jižní Austrálie, JV Austrálie, JZ Evropa, Nový Jižní Wales, Queensland, SV Austrálie, Španělsko, V Austrálie, Viktorie, Z Austrálie, Západní Austrálie

Dorůstá výšky 40 (i 50)cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

-
subsp. *clavellatum*

Disphyma dunsdonii

Disphyma papillatum

Další informace:

<https://botany.cz/cs/disphyma-australe/>

<http://www.rostliny.net/>