Disphyma australe

čeleď: Aizoaceae
oblasti: J Austrálie, J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Severním i Jižním ostrově Nového Zélandu a na jihu Austrálie. Patří mezi trvalky. Lodyha je plazivá, dlouhá i více než 1m. Listy vyrůstají vstřícně, jsou čárkovité až eliptické, zakulaceně 3boké, na vrcholu špičaté, zpravidla i hrotité, dlouhé 0,5 - 4cm, široké 4 - 9mm a báze klínovitá. Květy mají tlustou stopku délky 1 - 4cm, průměr 2 - 4cm, kalich je dužnatý, 5ticípý (2 cípy menší), korunní lístky jsou bílé až tmavěrůžové, vyrůstají v 3 - 5ti řadách a mají délku 1 - 3cm. Plodem je dužnatá tobolka obsahující hnědá semena délky 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. australe
- subsp. stricticaule - Kermadekovy ostrovy; krátké vzpřímené výhony, listy s kalichem bradavičnaté

Vyhovují mu pobřežní skály, štěrk, písečné duny (i slané mokřiny). Může se nalézt i na vápencových či pískovcových srázech.

https://www.rostliny.net/