

Tacca (Taka)

čeleď: Taccaceae

Existuje více než 20 druhů. Pochází z tropických oblastí Afriky, Austrálie a jihovýchodní Asie. Je jediným zástupcem čeledi Taccaceae. Pod zemí vytváří oddenky nebo hlízy. Listy mají dlouhé řapíky. Vyrůstají ve spirále z přízemní růžice. Zajímavé jsou především květy tvořené z 6ti lístků ve 2 přeslenech a nitkovité listeny. Plodem je bobule nebo tobolka.

Tacca abyssinica

Tacca amplipecta

Tacca angustilobata

Tacca ankaranensis

Tacca bibracteata

Tacca borneensis

Tacca brownii

Tacca celebica

Tacca chantrieri (Taka velkokvětá)

oblasti: Bangladéš, Indie, J Čína, Malajsie, Myanmar (Barma), Srí Lanka, Thajsko

Pochází z Indie a jihovýchodní Asie. Pod zemí je oddenek. Dorůstá výšky 20 - 70cm. Pod zemí vytváří tlusté válcovité oddenky. Listy jsou eliptické, špičaté s krátkým hrotem, zeleně pruhované, dlouhé 20 - 60cm, široké (4,4 -) 7 - 22 (i 25)cm, báze klínovitá až zakulacená a řapíky jsou dlouhé 10 - 30cm. Kvete na stvolu s prakticky černými 4mi listeny, vnější 2 jsou vejčitékopinaté, vnitřní široce vejčité, vlastní květy jsou seskupené do 5 - 18tičetého okolíku, mají úzce kopinaté tmavé listence, 6 okvětních lístků ve 2 kruzích, srostlé v trubku a mají 6 tyčinek. Plodem je eliptická hnědá tobolka délky 2 - 4cm, šířky do 3cm a obsahuje mnoho ledvinovitě tvarovaných semen. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *macrantha*

Vyhovují jí vlhké lesy, břehy potoků, atp. ve stínu až polostínu. Půda by měla být stále vlhká, ale ne přemokřená, ideálně navíc propustná a bohatá na živiny. Odolává teplotám do 5°C.

Tacca ebeltajae

Tacca flabellata

Tacca integrifolia

Tacca leontopetaloides

oblasti: Austrálie, Havajské ostrovy, JV Asie, Z Afrika

Roste od západní Afriky po jihovýchodní Asii, Austrálii a i v Tichém oceánu. Pod zemí vytváří kulovitou až eliptickou hnědou na řezu bílou hlízu. Listy jsou přizemní, dlouhé do 70cm, široké až 1,2m, dlanité s přetřhovaně zpeřenými úkrojky či lístky, lístky posledního řádu jsou kopinaté, asymetricky laločnaté zelené, mají síťnatou žilnatinu a řapíky mohou mít délku 0,2 - 1,5m. Květná lodyha je tlustá, přímá a na vrcholu vytváří okolík se 4 - 12ti vejčitými zelenými a na okrajích nahnědlými listeny, květní stopky mají na bázi až 25cm dlouhé nitkovité listence, vlastní květy mají 6 okvětních lístků srostlých na bázi, bývají nazelenalé, dlouhé 5cm a vytvářejí 2 kruhy. Jsou opylovány mouchami. Plodem je vejčitá dužnatá žebrovaná tobolka délky 5cm obsahující mnoho semen.

Vyhovují ji lesní křoviny a průměrné teploty 23 - 28°C.

Tacca nivea

Tacca palmata

Tacca palmatifida

Tacca parkeri

Tacca paxiana

Tacca pinnatifida

Tacca plantaginea

oblasti: Indočína, J Čína

Pochází z jižní Číny a Indočíny.

Tacca subflabellata

Tacca viridis

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Tacca>

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/taka-chantrierova>

<https://botany.cz/cs/tacca-leontopetaloides/>

<https://www.rostliny.net/>