

Chaerophyllum (Karabilice)

synonyma: Chrysophae, Neoconopodium

čeleď: Apiaceae

Pochází z Evropy, Asie, severní Afriky a Severní Ameriky. Kvete v okolíku. Plodem je nažka nebo 2nažka.

Chaerophyllum aksekiense

Chaerophyllum angelicifolium

synonyma: C. lasiolaenum, C. orthostylum, C. silvicola, C. silvicola var. minus

Chaerophyllum aromaticum (Krabilice zápašná)

oblasti: Česká republika, Itálie, Německo, Polsko

Dorůstá výšky až 2m. Lodyha je ochlupená. Listy má 2x zpeřené, ochlupené, dlouhé i široké 25cm a jsou tvořené vejčitými nebo eliptickými zašpičatělými lístky s 2x pilovým okrajem. Vlasní lístky jsou vejčité až eliptické s jemně pilovým okrajem. Kvete bílými květy v deštníkovitém okolíku.

Vyhovují jí vlhčí místa, polostín, houštiny, příkopy, atp.

Chaerophyllum astrantiae

Chaerophyllum atlanticum

Chaerophyllum aurantiacum

Chaerophyllum aureum (Krabilice zlatoplodá)

synonyma: C. hybridum, C. maculatum, C. monogonum, C. temuloides, C. temuloides var. trapezutinum, C. trapezuntinum, Croaspila aurea

oblasti: Andalusie, Česká republika, Írán, Itálie, Katalánsko, Německo, Švýcarsko

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,5 -) 0,8 - 1 (i 1,2)m. Lodyha je přímá a rýhovaná. Listy mají kopinatý tvar, jsou 3 - 4x zpeřené, dlouhé 30cm, úkrojky zašpičatělé a peřenoklanné nebo peřenosečné. Vydávaj aromatickou vůni podobnou mrkvi. Kvete žlutými květy v okolíku. Plody mají velikost 0,7 - 1,1cm.

Vyhovuje jí plné slunce a vlhké půdy bohaté na živiny, zejména dusík v křovinách okrajích cest a lesů, příkopech, atp.

Chaerophyllum azoricum

Chaerophyllum bobrovii

synonyma: *C. bulbosum* subsp. *bobrovii*

Chaerophyllum borodinii

Chaerophyllum bulbosum (Krabalice hlíznatá)

synonyma: *C. bulbosum* var. *caucasicum*, *C. caucasicum*, *C. laevigatum*, *C. neglectum*, *C. rapaceum*, *C. verticillatum*

oblasti: Česká republika, Írán, Německo, Polsko, Z Asie

Pochází z Evropy a západní Asie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,8 (i 2)m. Kořeny jsou jedlé, vypadají jako tmavěšedá mrkev se žlutobílou dužinou. Připravuje se vařením. Stonek je ve spodní části červeně skvrnitý a štětinatý. Listy jsou špičaté, 2 - 3x zpeřené s úzce kopinatými úkrojky. Kvete bílými květy v okolíku. Ten je seskupený do 7 - 20tičetného deštníkového okolíku. Okvětní lístky jsou do poloviny vykrojené. Listy obsahují jedovaté látky.

Vyhovují mu lužní lesy, rumiště, atp.

Chaerophyllum byzantinum

synonyma: *C. angelicifolium*, *C. byzantinum* var. *biledjikense*, *C. byzantinum* var. *hirtum*, *C. byzantinum* var. *puberulum*, *C. orientale*

Chaerophyllum capnoides

synonyma: *Apotaenium capnoides*, *Bunium nepalense*, *Butinia capnoides*, *Conopodium capnoides*

oblasti: Pákistán

Roste v Pákistánu jako bylina. Dorůstá výšky do 35cm. Pod zemí vytváří hlízovité kulovité kořeny. Stonek je ochlupený. Listy jsou 2x zpeřené, řapíkaté a lístky jsou kopinaté až eliptické. Květenstvím je okolík s 5 - 7mi paprsky, okolíčky mají 8 - 12 stopek 3 - 4x delších květů a korunní lístky jsou bílé.

Chaerophyllum coloratum

synonyma: *Chrysophae colorata*, *Croaspila colorata*, *Grammosciadium coloratum*

Chaerophyllum confusum

Chaerophyllum creticum

synonyma: *Chrysophae cretica*, *Grammosciadium creticum*

Chaerophyllum crinitum

synonyma: C. freynii, C. pauciradiatum

oblasti: Írán

Chaerophyllum dasycarpum

synonyma: C. procumbens var. dasycarpum, C. tainturieri var. dasycarpum

Chaerophyllum elegans

oblasti: Itálie, Švýcarsko

Chaerophyllum euboicum

Chaerophyllum hakkiaricum

Chaerophyllum heldreichii

synonyma: Grammosciadium heldreichii

Chaerophyllum hirsutum (Krabilice chlupatá)

synonyma: Bellia hirsuta, C. cicutaria, C. pallescens, C. palustre, C. umbrosum

oblasti: Andalusie, Česká republika, Itálie, Německo, Polsko, Švýcarsko

Pochází ze střední a jižní Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,4 - 1,2 (i 1,5)m. Listy jsou 2 - 3x zpeřené, dlouhé 40cm, vlastní lístky hluboce pilovité. Vydávají jablečné aroma. Kvete bílými nebo narůžovělými květy v okolíku. Plody mají velikost 0,8 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. hirsutum (Krabilice chlupatá pravá)
- subsp. magellense/Ch. magellense - endemit Itálie
- subsp. villarsii

Vyhovují ji vlhčí půdy bohaté na živiny v prameništích, okrajích potoků, atp.

Chaerophyllum humile

Chaerophyllum karsianum

Chaerophyllum khorossanicum

oblasti: Írán

Chaerophyllum kiapazi

Chaerophyllum laseroides

Chaerophyllum leucolaenum

Chaerophyllum libanoticum

Chaerophyllum macropodum

oblasti: Írán

Chaerophyllum macrospermum

synonyma: Caropodium meoides, Golenkinianthe macrosperma, Grammosciadium meoides

oblasti: Írán

Chaerophyllum meyeri

oblasti: Írán

Chaerophyllum nivale

oblasti: Írán

Chaerophyllum oligocarpum

Chaerophyllum posofianum

Chaerophyllum procumbens

synonyma: C. articulatum, C. bifidum, C. boscii, C. procumbens var. tainturieri, Scandix procumbens

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Chaerophyllum reflexum

synonyma: C. cachemiricum

oblasti: Afganistán, Himálaj, Indie, Pákistán

Roste v Afganistánu, Himálaji, Indii a Pakistánu. Dorůstá výšky do 1m. Pod zemí vytváří protáhlejší kořeny. Stonek může být ochlupený. Listy jsou 2x zpeřené a mohou být ochlupené. Květenstvím je okolík s 6 - 12ti paprsky a 5 - 8mi kopinatými listeny. Plody jsou válcovité až eliptické a dlouhé 0,7 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acuminatum*/Ch. *acuminatum* - Himálaj, Indie, Pakistan; výška do 60cm; listy 1 - 2x zpeřené, lístky čárkovité až kopinaté; květenství nestejně s 7 - 10ti paprsky, korunní lístky bílé; plody válcovité, dlouhé 8mm
- var. *dissectum*

Chaerophyllum roseum

synonyma: *C. brachycarpum*, *C. millefolium*, *C. tenuifolium*

Chaerophyllum rubellum

synonyma: *C. roseum* var. *rubellum*

Chaerophyllum syriacum

Chaerophyllum tainturieri

synonyma: *C. daucophyllum*, *C. floridanum*, *C. tainturieri* var. *floridanum*, *C. texanum*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Chaerophyllum temulum (Krabilice mámivá)

synonyma: *C. temulentum*, *C. temulum* f. *eriocarpum*

oblasti: Česká republika, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, New Jersey, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Švýcarsko

Podle místa se může jednat o jedno- nebo dvouletku. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 2)m. Lodyha je rýhovaná s chloupkami a červenofialovými skvrnami. Spodní listy mají řapíky. Čepele jsou ochlupené, 1 - 2x zpeřené, s lístky s hluboce laločnatě vykrajovanými okraji. Kvete v 5 - 6cm okolíku bílými květy. Plodem je 2nažka.

Chaerophyllum tenuifolium

Chaerophyllum villarsii

synonyma: *C. alpestre*, *C. hirsutum* subsp. *villarsii*, *C. rigidum*

oblasti: Itálie, Německo, Švýcarsko

Chaerophyllum villosum

synonyma: *Anthriscus boissieu*, *C. reflexum*

oblasti: Afganistán, Himálaj, Indie, Pákistán

Roste v Afganistánu, Himálaji, Indii a Pakistánu. Dorůstá výšky do 60cm. Pod zemí vytváří protáhlé kořeny. Povrch je ochlupený. Listy jsou 2 - 3x zpeřené, ochlupené a přízemní mají pochvu. Květenstvím je okolík s 6 - 10ti paprsky a 5 - 6ti čárkovitými listeny. Plody jsou válcovité a dlouhé 6 - 9mm.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K574.php>

<http://botany.cz/cs/chaerophyllum-hirsutum/>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/krabilice-zlata>

<http://rostliny.nikde.cz/rostliny-evropy/160/chaerophyllum-aromaticum-l-krabilice-zapasna>

<https://www.rostliny.net/>