

Galinsoga (Pěťour)

čeleď: Asteraceae

Pochází z Jižní Ameriky. Kvete v úboru se žlutým středem a bílými okvětními lístky. Charakteristické je, že okvětní lístky nevyrostají po celém obvodu, ale jsou mezi skupinkami zubaté mezery. Plodem je nažka.

Galinsoga amboensis

Galinsoga boliviensis

oblasti: Bolívie

Galinsoga caligensis

Galinsoga ciliata

synonyma: *G. parviflora* var. *hispida*

oblasti: Katalánsko, Německo, Polsko, Švýcarsko

Galinsoga crozierae

Galinsoga durangensis

oblasti: Durango

Galinsoga eligulata

Galinsoga formosa

Galinsoga humboldtii

Galinsoga longipes

Galinsoga macrocephala

Galinsoga mollis

Galinsoga parviflora (Pěťour malokvětý)

synonyma: *Adventina parviflora*, *G. hirsuta*, *G. laciniata*, *G. parviflora* f. *parceglandulosa*, *G. parviflora* f. *subeglandulosa*, *G. parviflora* subsp. *parceglandulosa*, *G. parviflora* var. *adenophora*, *G. quinqueriata*, *G. semicalva*, *Stemmatella sodiroi*, *Vigolina acmella*, *Wiborgia acmella*, *Wiborgia parviflora*

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Jižní Americe jako jednoletka. Dorůstá výšky do (10 -) 20 - 60 (i 80)cm. Lodyha je holá nebo řídce přitiskle ochlupená. Vstříčné listy jsou v horní části přisedlé, mají dlouze vejčitý tvar se špičkou, drobně pilový okraj (zuby kratší než 2mm). Kvete v úboru o průměru 4 - 7mm, terč je žlutý, okvětní lístky bílé délky menší než 1/2 průměru terče. Plodem je nažka délky 1,3 - 1,5mm s chmýrem 1 - 1,7mm.

Vyhovují mu vlhčí hlinité nebo písčité půdy bohaté na dusík.

Galinsoga quadriradiata (Pěťour srstnatý)

synonyma: *G. aristulata*, *G. bicolorata*, *G. caracasana*, *G. ciliata*, *G. urticifolia*

oblasti: Alabama, Alberta, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Peru, Portoriko, Quebec, Rhode Island, S Andy, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Andách Peru jako jednoletka. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 60 (i 90)cm. Lodyha je hustě jemně štětinatě ochlupená. Vstříčné listy mají řídce hrubě zubatý okraj (zuby velikosti až 2mm) a jsou štětinatě ochlupené. Květenství je uspořádáno ve vidlanech a vlastní květy do štětinatého úboru o průměru 4 - 7mm, okvětní lístky jsou bílé, min. stejně dlouhé jako 1/2 průměru terče a terč je žlutý. Plodem je nažka délky 1,2 - 1,5mm s chmýrem délky 1,5 - 1,8mm.

Je citlivý na mráz. Vyhovuje mu alespoň částečně zkyplená půda, spíše bez jílu nebo vápna.

Galinsoga repens

Galinsoga semicalva

Galinsoga spellenbergii

Galinsoga subdiscoidea

Galinsoga triradiata

Další informace:

<http://atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=1896>

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K459.php>

<http://botany.cz/cs/galinsoga-quadriradiata/>

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9B%C5%A5our_malo%C3%BAborn%C3%BD

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/petoursrst.htm>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=116>

<https://www.rostliny.net/>