

Lycoris

čeleď: Amaryllidaceae

Pochází z východní a jižní Asie. Rodové jméno odpovídá jménu herce starého Říma. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Pod zemí vytváří kulovitou nebo vejčitou cibuli s kratším krkem. Listy jsou vzpřímené, dlouhé také 30 - 60cm při šířce pouhých 0,5 - 2cm a vyrůstají přímo z cibule. Kvete na květním stvolu 4 - 10ti nálevkovitými květy v barvě bílé, žluté, oranžové nebo červené. Podobá se lilii nebo amarylisu. Plodem je 3chlopňová tobolka s několika černými semeny. Nejznámějšími druhy jsou L. radiata a L. squamigera. Existují hybridy:

- L. x albiflora
- L. x houdyshelii
- L. x rosea - možná se jedná o L. radiata x L. sprengeri

Vyhovuje mu dobře propustná půda bohatá na živiny, střední zálivka a plné slunce.

Mnoho druhů se množí pouze dělením cibulí, protože jsou sterilní a semena nevytvářejí.

Lycoris anhuiensis

Lycoris aurea

synonyma: L. africana

oblasti: Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Laos, Myanmar (Barma), Pákistán, Shaanxi, Sichuan, Thajsko, Vietnam, Yunnan, Zhejiang

Roste v Číně, Thajsku, Laosu, Vietnamu, Myanmaru a Pákistánu. Pod zemí vytváří vejčitou cibuli průměru 5cm. Dorůstá výšky do 60cm. Na podzim z ní vyrůstají listy se světlejší centrální žilkou. Svol nese 5 - 7 květů, korunní lístky jsou úzké, zvlněné, zpětně obrácené a žluté.

Vyhovují mu vlhká místa ve svazích nebo skalních puklinách.

Lycoris caldwellii

Lycoris chinensis

Lycoris guangxiensis

Lycoris incarnata

Lycoris longituba

Lycoris radiata (Pavoučí lilie)

oblasti: Anhui, Florida, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Illinois, Japonsko, Jiangsu, Jiangxi, Jižní Karolína, Korea, Louisiana, Mississippi, Nepál, Severní Karolína, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Tennessee, Yunnan, Zhejiang

Roste v Číně, Japonsku, Koreji a Nepálu. Dorůstá výšky 30cm. Pod zemí vytváří cibuli průměru 2cm. Listy zůstávají zelené po celou zimu. Odumírají s prvním příchodem teplejšího počasí. Kvete červenými květy v počtu 4 - 7ks, korunní lístky jsou úzké, zvlněné, zpětně ohnuté a mají dlouhé tyčinky. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. alba - květy bílé
- var. pumila
- var. radiata

Vyhovuje ji plné slunce, teplo (ne horko) a vlhké, dobře propustné písčité půdy na březích vod.

Množí se pouze dělením cibulí.

Lycoris sanguinea

oblasti: Korea, S Japonsko, Střední Japonsko, Šikoku

Roste v Japonsku a Koreji. Dorůstá výšky 30 - 40cm. Květenství je 4 - 6tičetné a vlastní květy jsou tmavěčervené. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Cinnabarina' - květy oranžové
- var. kiushiana - Kjúšú; květy oranžové, korunní lístky užší
- var. koreana

Není mrazuvzdorný.

Lycoris shaanxiensis

Lycoris sprengeri

Lycoris squamigera

oblasti: Japonsko, Jiangsu, Korea, Ohio, Shandong, Tennessee, Zhejiang

Pochází z Japonska, Koreje a Číny. Jedná se pravděpodobně o hybrid L. straminea a L. incarnata. Dorůstá výšky 40 - 60 (i 70)cm. Pod zemí vytváří cibuli průměru 5cm. Listy vytváří na jaře a odumírají během června. Kvete bílými nebo růžovými květy v počtu 4 - 5ks, jsou trubkovité až nálevkovité, světlorůžové se žlutým pruhem uprostřed a mohou být mírně zvlněné.

Vyhovují mu teplá vlhká místa a blízkost vody. Půda by měla být bohatá na živiny a propustná. Na zimu se doporučuje zakrytí suchým listím.

Množí se dceřinými cibulkami a vysazují se do hloubky 15 - 20cm.

Lycoris straminea

Lycoris traubii

Další informace:

<http://www.abecedazahrady.dama.cz/default.aspx?section=4&server=1&catalog=1&catitem=648>

<https://www.rostliny.net/>