

Polymnia

čeleď: Asteraceae

Nejznámějším druhem je *P. sonchifolia*.

Polymnia canadensis

synonyma: *P. radiata*

Polymnia cossatotensis

oblasti: Arkansas

Polymnia fruticosa

Polymnia glabrata

Polymnia laevigata

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Missouri, Tennessee

Polymnia sonchifolia (Jakon)

oblasti: Andy, Bolívie, Peru

Pochází z východních svahů And v Jižní Americe. Patří mezi vytrvalé byliny. V našich podmínkách je to pouze jednoletka. Dorůstá výšky až 2 (i 3)m. Pod zemí vytváří jedlou hlízu podobnou topinambuře, pohromadě jich bývá 5 - 20ks, hmotnost se pohybuje v rozmezí 0,2 - 0,5 (i 2)kg, povrch je šedohnědý až fialový, dužina je křehká, šťavnatá a má bílou nebo nažloutlou či nafialovělou barvu. Povrch je ochlupený, zelený, ale může být i nafialovělá. Stonky mají čtvercový průřez. Pokud jsou mladé, používají se s listy jako listová zelenina. Vstřícné listy mají vejčitý tvar se špičkou a pilovým okrajem. Málokdy kvete žlutými květy v úboru na vrcholcích lodyh. Hlízy se vytvářejí i na stoncích a jsou tečkované. Plodem je hnědočerná nažka.

Vyhovuje mu lehká sušší dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se hlízami nebo semeny.

Další informace:

<http://www.garten.cz/a/cz/3288-polymnia-sonchifolia-jakon/>

<http://www2.zf.jcu.cz/~moudry/databaze/Jakon.htm>

<https://www.rostliny.net/>