

Centella (Pupečníkovec)

synonyma: Trisanthus

čeleď: Apiaceae

Roste v jižní Asii a na jižní polokouli jako plazivá jednoletka. Lodyhy jsou slabé, v uzlinách znovu zakořeňující. Listy bývají dlouze řapíkaté, prakticky kulaté a se srdčitou bází. Květenstvím je okolík, vlastní květy jsou drobné a krátce stopkaté. Nejznámějším druhem je *C. asiatica*.

Vyhovuje mu vlhká půda.

Množí se dělením.

Centella asiatica (Pupečníkovec asijský)

synonyma: *Hydrocotyle asiatica*, *Trisanthus cochinchinensis*

oblasti: Čína, Havajské ostrovy, Indie, Írán, J Afrika, Japonsko, Jáva, Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Nová Guinea, Oregon, Pákistán, S Austrálie, Srí Lanka

Roste na Madagaskaru v Indii a Srí Lance, Íránu, Indonésii, Malajsii, Melanésii, Nové Guineji, Austrálii, atd. jako mokřadní trvalka. Dorůstá výšky (2,5 -) 8 - 10 (i 15)cm, ale poléhavé nebo převislé výhony jsou dlouhé až 2 (i 2,5)m. Listy jsou zelené, ledvinovité, zoubkaté, dlouze řapíkaté a chuťově sladkohořké. Kvete drobnými růžovofialovými oboupohlavnými květy ve (2 -) 3 - 4 (i 7) mikvětých svazečcích pod listy, vlastní květy jsou bílé a kalich je zubatý. Plodem je dvounažka, jsou vejčité až kulovité a dlouhé 2 - 3mm. Nať a listy se používají v léčitelství.

Není mrazuvzdorný. Lze jej pěstovat ve standardním substrátu. Zálivka musí být bohatá, na zimu zmírněná s min. teplotou 10 - 15°C. Lze jej pěstovat v závěsném truhlíku.

Množí se řízkem, zakořeňováním výhonů v uzlicích nebo semeny.

Centella erecta

synonyma: *C. repanda*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, New Jersey, Ohio, Oregon, Portoriko, Severní Karolína, Texas, Virginie

Centella villosa

Další informace:

<http://www.garten.cz/a/cz/5341-centella-asiatica-pupecnik-asijsky-gotu-kola/>

<https://www.rostliny.net/>