

Dendrocniide (Kopřivák)

čeleď: Urticaceae

Roste v jihovýchodní Asii, Austrálii a Tichomoří v podobě keře nebo stromu. Listy má střídavé, s výraznější žilnatinou, jsou opatřené žahavými chlupy a dorůstají větších rozměrů. Plodem je nažka.

Dendrocniide corallodesme

oblasti: Nová Guinea, SV Austrálie

Pochází ze severovýchodní Austrálie a Nové Guineje. Roste v podobě stromů. Dorůstá výšky až 6m. Střídavé listy mají eliptický tvar se špičkou, délku 12 - 20cm a šířku 4 - 7cm. Kvete jednopohlavnými květy. Plodem je nažka.

Dendrocniide cordata

synonyma: Laportea cordata, Laportea cordifolia

oblasti: Melanésie, Nová Guinea, SV Austrálie

Pochází ze severovýchodní Austrálie, Moluk, Nové Guineje a Bismarkova souostroví. Dorůstá výšky až 10m. Střídavé listy mají široce vejčitý tvar se srdčitou bází, se zubatým okrajem a špičkou. Dosahují délky 18 - 25cm a šířky 16 - 22cm, délka řapíku se pohybuje v rozmezí 18 - 22cm. Kvete jednopohlavnými květy.

Dendrocniide excelsa

synonyma: Laportea gigas, Urera excelsa, Urera rotundifolia, Urticastrum gigas

oblasti: SV Austrálie, V Austrálie

Pochází z východní a severovýchodní Austrálie. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky až 35 (i 40)m při průměru kmene 4m. V této velikosti je jasně viditelná žebrovitá pata stromu, která mu dodává stabilitu. Střídavé listy mají pilový okraj, vejčitý tvar a srdčitou bází. Podobají se listům lípy. Ochlupení dráždí lidskou pokožku. Kvete v krátké latě. Plodem je červený oříšek.

Dendrocniide latifolia

Dendrocniide meyeniana

Dendrocniide moroides (Kopřivák morušovitý)

synonyma: Laportea moroides, Urticastrum moroides

oblasti: Indonésie, Melanésie, Nový Jižní Wales, Queensland

Pochází z Austrálie, Moluckých ostrovů a Indonésie. Dorůstá výšky 1 - 2m. Kmínek bývá pouze 1. Vejčité listy se špičkou a srdčitou bází a pilovým okrajem mají délku 12 - 22cm a šířku 11 - 18cm. V

květenství je několik samčích květů a ty jsou obklopeny mnoha samičími. Plodem je mnohočetná bobule barvy sytě růžové až fialové. Každý plod obsahuje 1 semeno.

Dendrocnide peltata

synonyma: *D. peltata* subsp. *murrayana*, *Laportea murrayana*, *Urtica peltata*

Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m při průměru kmene 65cm. Barva borky přechází od zelené po šedou. Listy mají široce oválný tvar se zakulacenou bází. Kvete v hroznech na koncích větví drobnými květy. Plodem je zelená nebo hnědá bobule průměru 2cm s jediným semenem velikosti asi 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *peltata* - Jáva, Bali, Nová Guinea, Vánoční ostrovy
- var. *murrayana* - endemit Vánočních ostrovů

Dendrocnide photinophylla

synonyma: *Fleurya photinophylla*, *Laportea photinophylla*, *Urera leichardiana*, *Urticastrum photinophyllum*

oblasti: SV Austrálie, V Austrálie

Pochází z východní a severovýchodní Austrálie. Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m při průměru kmene 75cm. Borka má šedou barvu. Listy mají eliptický tvar se špičkou, lesklý hladký povrch, délku 6 - 13cm a šířku 3 - 8cm. Kvete žlutozelenými květy. Plodem je oříšek nebo nažka. Může být jedlý, pokud se odstraní ochlupení.

Dendrocnide sinuata

synonyma: *Laportea crenulata*

oblasti: Bhútán

Pochází z Bhútánu. Roste v podobě keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky 2 - 4 (i 10)m. Střídavé listy mají vejčitý nebo eliptický tvar se špičkou a srdčitou bází, délku 20 - 35 (i 65)cm a šířky 8 - 18 (i 35)cm a jsou opatřeny žahavými chloupky. Kvete samostatnými samčími a samičími květy. Plodem je vejčitá nažka.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1227>

<https://www.rostliny.net/>