

## Prenanthes (Věsenka)

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe, Asii a Africe. Listy jsou laločnaté. Kvete v barvách bílé, žluté nebo růžové. Nejznámějším druhem je *P. purpurea*.

### Prenanthes abietina

oblasti: Gruzie

Listy jsou hrálovité.

### Prenanthes acerifolia

#### Prenanthes affinis

##### Prenanthes alata

synonyma: *P. lessingii*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Oregon, Washington

##### Prenanthes alba

synonyma: *Nabalus albus*

oblasti: Arkansas, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

##### Prenanthes altissima

synonyma: *Nabalus altissimus*, *P. altissima* var. *cinnamomea*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Labrador, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Západní Virginie

##### Prenanthes aspera

synonyma: *Nabalus asperus*

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Wisconsin

### Prenanthes autumnalis

synonyma: *Nabalus virgatus*, *P. virgata*

oblasti: Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Maryland, New Jersey, Severní Karolína, Virginie

### Prenanthes barbata

synonyma: *P. serpentaria* var. *barbata*

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Texas

### Prenanthes boottii

synonyma: *Nabalus boottii*

oblasti: Maine, New Hampshire, New York, Quebec, Vermont

### Prenanthes carrii

### Prenanthes crepidinea

synonyma: *Nabalus crepidineus*

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Minnesota, Missouri, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Wisconsin, Západní Virginie

### Prenanthes cymosa

### Prenanthes diversifolia

### Prenanthes glandulosa

### Prenanthes khasiana

### Prenanthes longifolia

### Prenanthes macilenta

### Prenanthes mainensis

### Prenanthes nana

synonyma: *Nabalus nanus*, *P. trifoliolata* var. *nana*

oblasti: Maine, New Hampshire, New York

### Prenanthes petiolata

oblasti: Kavkaz

### Prenanthes purpurea (Věsenka nachová)

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, SZ Evropa, Švýcarsko

Roste ve střední Evropě s přesahem na severozápad Evropy a k středozemí jako dvouletka. Dorůstá výšky (0,3 -) 0,5 - 1,5 (i 1,6)m. Patří mezi trvalky. Lodyha je přímá, dutá a hladká, větvená v horní části a je pouze řidce ochlupená. Střídavé listy mají šedozeleň barvu, kopinatý až mírně obvejčitý tvar, chobotnatě peřenodílný okraj, střední a horní jsou ouškatě objímavé. Kvete růžovofialovými květy v nevýrazných převislých 3 - 5tičetných úborech uspořádaných do lat, zákrov je 2řadný, vnější zákrovní listeny výrazně kratší než vnitřní, dlouhé 1,2 - 1,3cm. Plodem je plochá nažka se 3- 5ti hranami délky 5mm bez zobáku a s chmýrem.

Vyhovuje ji stín nebo polostín, vlhké listnaté nebo smíšené lesy, okraje vody, louky, rokle, atp. s půdou bohatou na živiny s pH neutrálním nebo kyselým.

Množí se semeny.

### Prenanthes racemosa

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Wisconsin, Wyoming

### Prenanthes roanensis

synonyma: *Nabalus cylindricus*, *Nabalus roanensis*, *P. cylindrica*

oblasti: Severní Karolína, Tennessee, Virginie

### Prenanthes rostrata

### Prenanthes sagittata

synonyma: *P. alata* var. *sagittata*

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Montana

### Prenanthes scandens

## Prenanthes serpentaria

synonyma: *Nabalus integrifolius*, *Nabalus serpentarius*, *P. integrifolia*

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

## Prenanthes steenisii

## Prenanthes stenolimba

## Prenanthes stricta

## Prenanthes subpeltata

## Prenanthes sumatrana

## Prenanthes tanakae

## Prenanthes trifoliolata

synonyma: *Nabalus trifoliolatus*

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

## Prenanthes vitifolia

## Prenanthes volubilis

## Prenanthes x mainensis

oblasti: Maine, New York

## Prenanthes yakoensis

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K717.php>

<http://botany.cz/cs/prenanthes-purpurea/>

[http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bsenka\\_nachov%C3%A1](http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bsenka_nachov%C3%A1)

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=395>

<https://www.rostliny.net/>