

Bunias (Rukevník)

čeleď: Brassicaceae

Bunias cochlearioides

Bunias erucago (Rukevník roketovitý)

oblasti: Itálie, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Pennsylvania, Středozeří, Švýcarsko, Virginie

Pochází ze středozeří a Malé Asie. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy mají lyrovitý až kracovitý peřenoklaný tvar. Kvete světležlutými květy na 1,5 - 3,5cm topkách. Plod má nepravidelně zbuaté křídlové lišty ostře zúžené v úzký zobánek.

Vyhovují mu náspy a rumiště.

Bunias orientalis (Rukevník východní)

synonyma: B. verrucosa, Laelia orientalis

oblasti: Arménie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Írán, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Střední Sibiř, Švýcarsko, V Sibiř, Vermont, Virginie, Wisconsin, Z Sibiř

Pochází z Arménie. Roste ale už i na Kavkaze, Evropě, západní Sibiři, Dálném východě a Severní Americe. Patří mezi dvouletky až víceletky. Dorůstá výšky 0,25 - 1,2m. Lodyha je přímá, v horní části bohatě větvená. Může být i ochlupená. Řapíkaté listy jsou nepravidelně lyrovité až kracovité a peřenolaločné. Mají vysoký obsah vitamínu C a proteinů. Kvete světležlutými květy v bohatých hroznech na 1 - 1,5cm stopkách. Plod je hrboletý, má vejčitý tvar přeházející v tlustý zobánek. Obsahuje 1 - 2 semena. Používá se v lidovém léčitelství.

Vyhovují mu náspy, rumiště, louky, okraje polí a cest, atp. v teplých oblastech.

Množí se semeny.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/bunias-orientalis/>

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=3229>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/rukevníkvýchodni.htm>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=588>

<http://www.naturabohemica.cz/bunias-orientalis/>

<https://www.rostliny.net/>