

Coronopus (Vranožka)

synonyma: Lepidium

čeleď: Brassicaceae

Pochází ze středozeemí. Uměle byla introdukována do Severní i Jižní Ameriky. Listy bývají obvykle hluboce laločnaté. Kvete drobnými bílými nebo fialovými květy.

Coronopus didymus (Vranožka podvojná)

synonyma: Carara didyma, Lepidium didymum

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Egypt, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Střední středozeemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Jižní Ameriky ale rozšířila se všude po světě jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky (15 -) 30 (i 40)cm. Přízemní a spodní listy vytvářejí růžici, jsou zpeřené, tvořené 6 - 10ti páry lístků délky 5 - 10cm, horní listy jsou podobné nebo peřenosečné, tvořené 3 - 5ti páry přisedlých nebo téměř přisedlých zpravidla z 1 strany zubatý lístků délky 1,5 - 3cm. Květenstvím je 30 - 60tikvětý hustý hrozen délky do 8cm, vlastní bílé nebo nažloutlé květy mají průměr 1mm, 3 - 4mm stopku, kališní lístky jsou dlouhé 0,5 - 0,9mm a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1mm. Plodem je šešule eliptického tvaru s vykrojením na spodní i horní straně, má délku 1,3 - 1,5 (i 1,7)mm, šířku 2,2 - 2,8mm a obsahuje hnědočervené semeno délky 1,5mm.

Vyhovují ji skládky, náspy, atp.

Coronopus lepidioides

Coronopus navasii

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 9 - 27 (i 30)cm. Listy jsou dlouhé 1 - 5cm a široké 2 - 8mm. Květy mají kališní lístky délky 1,2 - 1,5mm a korunní lístky jsou dlouhé 1,2 - 1,8mm. Plodem je šešule délky 2,1 - 2,8mm.

Coronopus niloticus

Coronopus squamatus (Vranožka šupinatá)

synonyma: Carara coronopus, Cochlearia coronopus, C. procumbens, C. ruellii, C. verrucarius, Lepidium squamatum, Nasturtium verrucarium, Senebiera coronopus

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,

Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Egypt, Etiopie, Florida, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, J Austrálie, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libye, Louisiana, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Massachusetts, Moldávie, Německo, New Jersey, New York, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardinie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Tasmánie, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

Pochází ze středozeemí, dostala se ale i do Británie, Portugalska, skandinávie, severní Afriky, Makaronésii, k Černému moři, Severní Ameriky a jižní Austrálie včetně Tasmánie. Jedná se o jednoletku nebo dvouletku. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Lodyha je poléhavá, dlouhá 5 - 30cm. Listy mají dlouhé řapíky, čepel je tvaru kopinatého až obkopinatého s peřenosečnými okraji, i vlastní úkrojky jsou zastřižované až peřenodílné a bazální jsou dlouhé 7 - 13cm. Kvete v hustém hroznu tvořeném 10 - 25ti květy v barvě bílé, kališní lístky jsou dlouhé 1 - 2mm a korunní jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm. Plodem je ledvinovitá šešule délky 2,5 - 3mm a šířky 4mm. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovují mu okraje cest, hlinité sešlapávané jílovité půdy bohaté na živiny.

Coronopus violaceus

Další informace:

<http://botany.cz/cs/coronopus-squamatus/>

<https://www.rostliny.net/>