

Erugastrum (Ředkevník)

čeleď: Brassicaceae

Existuje asi 18 druhů.

Erugastrum arabicum

Erugastrum brevirostre

Erugastrum canariense

oblasti: Makaronésie

Pochází z Kanárských ostrovů. Může se jednat o jednoletku i dvouletku. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy mají zelenou barvu a jsou plstnaté. Spodní jsou dlouze vejčité, zpeřeně laločnaté, lodyžní jsou pak poloobjímavé a drsně chlupaté. Květ tvoří 8 - 9 okvětních lístků. Plodem je šešule.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, teplo a vlhko.

Erugastrum cardaminoides

Erugastrum elatum

Erugastrum gallicum (Ředkevník galský)

synonyma: *Brassica erugastrum*

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Z Evropy, Západní Virginie

Pochází ze západní Evropy, ale rozšířil se i do Asie a Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky nebo dvouletky. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy neobjímají lodyhu. Kvete světležlutými květy s listeny. Plodem je šešule obvyklé délky 3 - 4cm.

Vyskytuje se při okrajích cest, rumištích, atp.

Erugastrum ifniense

Erugastrum leucanthum

Erugastrum littoreum

Erugastrum nasturtiifolium (Ředkevník potočnicolistý)

synonyma: *Sinapis nasturtiifolium*

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Švýcarsko

Pochází z jihozápadní Evropy. Patří mezi dvouletky až trvalky. Dorůstá výšky 0,2 - 1,1m. V přízemí úkrojky listů objímají lodyhu. Jsou lyrovitě peřenodílné až peřenosečné. Kvete žlutými květy bez listenů. Plodem je šešule obvyklé délky 2,2 - 2,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *benacense* - endemit Itálie
- subsp. *nasturtiifolium*

Vyskytuje se v trávnících, rumíštích, okrajích komunikací, atp.

Erugastrum palustre

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Erugastrum rifanum

Erugastrum rostratum

oblasti: Jemen

Roste pouze v Jemenu.

Erugastrum thellungi

Erugastrum varium

Erugastrum virgatum

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá výšky 0,6 - 1,1m. Přízemní listy jsou dlouhé 4,5 - 25cm, široké 1 - 5 (i 10)cm a jsou rozdělené na 3 - 7 páru segmentů. Květy mají kališní lístky délky 3,5 - 4mm a korunní lístky jsou dlouhé 0,7 - 1cm. Plodem je šešule délky 1,5 - 3,5 (i 4)cm, šířky 0,5 - 1mm a obsahuje max. 2 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. baeticum - sešule dlouhé do 2,5cm
- subsp. brachycarpum - šešule dlouhé 1,5 - 2 (i 2,5)cm
- subsp. pseudosinapis - šešule dlouhé 1,5 - 3,5 (i 4)cm
- subsp. virgatum - endemit Itálie

Další informace:

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/redkevnik-kanarsky>

<http://rostliny.nikde.cz/rostliny-evropy/313/erucastrum-nasturtiifolium-poiret-oeschulz-redkevnik-potocnicolisty>

<https://www.rostliny.net/>