

Jacobaea (Starček)

čeleď: Asteraceae

Jacobaea abrotanifolia

synonyma: *Senecio abrotanifolius*

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *abrotanifolia*
- subsp. *carpathica*
- subsp. *tirolensis*

Jacobaea adonidifolia

synonyma: *Adonigeron adonidifolius*, *Senecio adonidifolius*, *Senecio artemisiifolius*

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 30 - 70cm. Listy jsou střídavé. Květenstvím je úbor o průměru 0,8 - 1,2cm. Plodem je nažka délky 2 - 3mm s chmýrem délky 2 - 2,5mm.

Jacobaea alpina

synonyma: *Cineraria alpina*, *Cineraria cordata*, *Cineraria cordifolia*, *Cineraria difformis*, *Cineraria lyratifolia*, *Cineraria samnitum*, *Cineraria senecifolia*, *Senecio alpinus*, *Senecio cordatus*, *Senecio cordifolius*, *Solidago alpina*

oblasti: Alpy, Itálie, Švýcarsko

Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Kvete žlutými květy v úboru. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpina*
- subsp. *samnitum* - endemit Itálie

Jacobaea ambigua

synonyma: *Cineraria ambigua*, *Cineraria bicolor* subsp. *ambigua*, *Senecio ambiguus*, *Senecio gibbosus* subsp. *ambiguus*

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ambigua* - endemit Itálie
- subsp. *nebrodensis* - endemit Itálie
- subsp. *taygetea*

Jacobaea andrzejowskyi
synonyma: *Senecio andrzejowskyi*

Jacobaea aquatica
synonyma: *Senecio jacobaea* subsp. *barbareifolius*, *Senecio pratensis*

oblasti: Itálie

Jacobaea argunensis
synonyma: *Senecio erucifolius* subsp. *argunensis*

Jacobaea arnautorum
synonyma: *Cineraria arnautorum*, *Senecio alpinus* subsp. *arnautorum*, *Senecio arnautorum*,
Senecio erubescens, *Senecio pancicii*

Jacobaea auricula
synonyma: *Senecio auricula*

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá výšky 15 - 45cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Květenství má průměr 2,5 - 3,5cm. Plodem je nažka délky 3 - 3,5mm s chmýrem délky 6 - 7mm.

Jacobaea boissieri
synonyma: *Senecio boissieri*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy vytvářejí přízemní růžici a jsou řapíkaté. Květenstvím je úbor o průměru (0,8 -) 1 - 1,5cm. Plodem je nažka délky 2 - 4mm s chmýrem délky 5 - 6,5mm.

Jacobaea borysthenica
synonyma: *Senecio borysthenicus*, *Senecio divaricatus*

Jacobaea buschiana
synonyma: *Senecio buschianus*

Jacobaea candida
synonyma: *Cineraria candida*, *Cineraria nebrodensis*, *Cineraria taygetea*, *J. ambigua* subsp. *nebrodensis*, *Senecio ambiguus* subsp. *nebrodensis*, *Senecio candidus*, *Senecio cineraria* subsp. *nebrodensis*

Jacobaea cannabifolia

Jacobaea cilicia

synonyma: Arnica senencionoides, Senecio cilicius

Jacobaea delphiniifolia

synonyma: Senecio crinitus, Senecio delphiniifolius, Senecio delphiniifolius var. occidentalis

oblasti: Itálie

Jacobaea disjuncta

oblasti: Itálie

Jacobaea erratica

synonyma: Senecio barbareifolius

oblasti: Itálie

Jacobaea erucifolia

synonyma: Senecio autumnalis, Senecio erucifolius

oblasti: Itálie

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. arenaria
- subsp. erucifolia
- subsp. praealta
- subsp. tenuifolia

Jacobaea ferganensis

synonyma: Senecio ferganensis

Jacobaea gallerandiana

synonyma: Senecio galleridianus

Jacobaea gibbosa

synonyma: Cineraria gibbosa, Cineraria littoralis, J. maritima subsp. gibbosa, Senecio ambiguus subsp. gibbosus, Senecio gibbosus

Jacobaea gigantea

synonyma: Senecio giganteus

Jacobaea gnaphalioides

synonyma: Cineraria gnaphailoides, Conyza gnaphalioides, Senecio gnaphalioides, Senecio sariacus

Jacobaea incana

synonyma: Senecio incanus

oblasti: Itálie, Německo, Švýcarsko

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. carniolica/J. carniolica
- subsp. incana
- subsp. insubrica

Jacobaea inops

Jacobaea insubrica

oblasti: Itálie

Jacobaea leucophylla

synonyma: Senecio leucophyllus

oblasti: Katalánsko

Jacobaea lycopifolia

synonyma: Senecio erucifolius subsp. lycopifolius, Senecio lycopifolius

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Jacobaea maritima

synonyma: Cineraria maritima, Othonna maritima, Senecio cineraria var. bicolor, Senecio coronopifolius var. oasicolus, Senecio gibbosus subsp. cineraria, Senecio maritimus

oblasti: Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Irsko, Itálie, Korsika, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Řecko, Sardínie, Severní Amerika, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Tunisko, Velká Británie

Pochází ze středozemí. Byl zavlečen i do Velké Británie a Irska a také do několika částí Severní Ameriky. Patří mezi trvalky a stálezelené polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Povrch je bíle vlnitý. Stonek od báze dřevnatí a je hustě větvený. Zpeřeně vyhlížející listy jsou dlouhé 5 - 15cm, široké 3 -

7cm a tvoří je obkopinaté články také šedobíle plstnaté. Spodní listy jsou hluboce laločnaté, horní již tak hluboké nejsou. Kvete žlutými květy v úborech o průměru 1,2 - 1,5cm. Kolem středového disku je 10 - 13 kratších okvětních lístků. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bicolor* - endemit Itálie
- 'Cirrus'
- subsp. *gibbosa* - endemit Itálie
- subsp. *maritima*
- 'New Look'
- 'Ramparts'
- subsp. *maritima*
- 'Silverdust'
- 'Silver Filigree'
- 'White Diamond'

Vyhovuje mu plné slunce, méně pak polostín. Odolává teplotám do -12°C až - 15°C. Dokáže růst i v zasolené půdě.

Jacobaea maroccana

synonyma: *Senecio maroccanus*

Jacobaea minuta

synonyma: *Cineraria heterophylla*, *Cineraria minuta*, *Senecio minutus*

oblasti: Andalusie

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 5 - 25cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé, lodyžní spodní zubaté až laločnaté a střední peřenolaločné až peřenosečné. Květenstvím je úbor o průměru 0,8 - 2,7cm. Plodem je nažka délky 1,5 - 2,2mm s chmýrem délky 2 - 2,5 (i 3)mm.

Jacobaea mollis

synonyma: *Senecio mollis*

Jacobaea mouterdei

synonyma: *Senecio mouterdei*

Jacobaea ornata

Jacobaea othonnae

synonyma: *Cacalia pinnata*, *Iranecio othonnae*, *Senecio othonnae*

oblasti: Írán

Jacobaea paludosa

synonyma: *Cineraria serratifolia*, *Doria paludosa*, *Senecio bohemicus*, *Senecio paludosus*, *Senecio paludosus* subsp. *bohemicus*, *Senecio paludosus* subsp. *tomentosus*, *Senecio riparius*

oblasti: Itálie

Jacobaea persoonii

synonyma: *Senecio incanus* subsp. *italicus*, *Senecio incanus* subsp. *persoonii*, *Senecio incanus* var. *italicus*, *Senecio persoonii*

oblasti: Itálie

Jacobaea samnitum

synonyma: *Cineraria scordifolia* var. *samnitum*, *Senecio alpinus* var. *samnitum*, *Senecio samniticus*, *Senecio samnitum*

Jacobaea sandrasica

synonyma: *Senecio sandrasicus*

Jacobaea schischkiniana

synonyma: *Senecio schischkinianus*

Jacobaea subalpina

synonyma: *Cineraria cordifolia*, *Cineraria scordifolia* var. *auriculata*, *Senecio alpinus* subsp. *subalpinus*, *Senecio cordatus* subsp. *auriculatus*

Jacobaea trapezuntina

synonyma: *Senecio trapezuntinus*

Jacobaea uniflora

synonyma: *Senecio chabertii*, *Senecio halleri*, *Senecio uniflorus*, *Solidago uniflora*

oblasti: Itálie

Jacobaea vulgaris

synonyma: *Senecio flosculosus*, *Senecio foliosus*, *Senecio jacobaeoides*, *Senecio nemorosus*, *Senecio praealtus* subsp. *foliosus*

oblasti: Argentina, Austrálie, Idaho, Illinois, Indie, Irsko, Itálie, Kalifornie, Karpaty, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, New Jersey, New York, Norsko, Nový Zéland, Oregon, Pennsylvania, S Afrika, Sibiř, Střední Asie, Středozemí, SV Evropa, SZ Asie, Švédsko, Velká Británie, Washington

Pochází ze severu Euroasie a rozšířil se i v USA, Jižní Americe, Africe a Austrálii i Novém Zélandu.

Patří mezi dvouletky nebo trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Stonek je přímý, mírně ochlupený. Listy jsou zpeřeně laločnaté. Kvete žlutými květy o průměru 1,5 - 2,5cm. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *dunensis* - bez okvětních lístků
- subsp. *gotlandica*
- subsp. *vulgaris*

<https://www.rostliny.net/>