

Anoda (Anoda)

čeleď: Malvaceae

Existuje 23 - 24 druhů. Většina z nich pochází z Mexika a Jižní Ameriky. Listy mají rozmanité tvary. Podobně i květy nabývají mnoha barev. Plody mají diskovitý tvar.

Anoda abutiloides

synonyma: *A. caudatifolia*, *A. urophylla*, *Sida caudatifolia*

oblasti: Arizona

Anoda acerifolia

synonyma: *A. zuccagnii*

oblasti: Arizona, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Anoda albiflora

Anoda crenatiflora

oblasti: Arizona, Texas

Anoda cristata (Anoda hřebenitá)

synonyma: *A. acerifolia* var. *minoriflora*, *A. arizonica*, *A. arizonica* var. *digitata*, *A. brachyantha*, *A. cristata* var. *albiflora*, *A. cristata* var. *brachyantha*, *A. cristata* var. *digitata*, *A. dilleniana*, *A. fernandeziana*, *A. hastata*, *A. incarnata*, *A. lavaterioides*, *A. populifolia*, *A. triangularis*, *A. triangularis* var. *digitata*, *A. triloba*, *Cavanillea hastata*, *Sida acerifolia*, *Sida centrota*, *Sida cristata*, *Sida deltoidea*, *Sida dilleniana*, *Sida hastata*, *Sida mexicana*, *Sida quinqueangulata*, *Sida quinqueloba*, *Sida triangularis*, *Sida zuccagnii*

oblasti: Arizona, Arkansas, Austrálie, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Massachusetts, Mexiko, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v Mexiku a části střední Ameriky. Zavlečena byla do Austrálie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Stonek je větvený. Listy nabývají různých starů. Obvykle se blíží trojúhelníkovému, dále mohou být vejčité, hrálovité nebo dlanité. Jsou ochlupené. Kvete růžovofialovými až modrofialovými či červenofialovými (vzácně bílými) květy o průměru 2 - 3cm. Plod má diskovitý tvar složený z 9 - 20ti tobolek. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Opal Cup'

- 'Snow Cup'

Množí se semeny.

Anoda guatemalensis

oblasti: Guatemala

Anoda henricksonii

Anoda hintoniorum

Anoda hirta

Anoda lanceolata

synonyma: A. wrightii, Sida unidentata

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Anoda leonensis

Anoda maculata

Anoda palmata

Anoda paniculata

Anoda pedunculosa

Anoda pentaschista

synonyma: A. extrema, A. pentaschista var. obtusior, Sidanoda pentaschista

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nové Mexiko, Texas

Anoda polygyna

Anoda pristina

Anoda reticulata

oblasti: Arizona

Anoda speciosa

Anoda succulenta

Anoda thurberi

oblasti: Arizona

<https://www.rostliny.net/>