

Hornungia (Řeřišník)

čeleď: Brassicaceae

Roste v Euroasii, *H. procumbens* i v Severní Americe. Patří mezi jednoletky. Kvete bílými květy.

Hornungia alpina

synonyma: *Arabis angustifolia*, *Astylus alpinus*, *Capsella alpina*, *Crucifera hutchinsia*, *Draba nasturtium*, *H. alpina* subsp. *polatschekii*, *Hutchinsia affinis*, *Hutchinsia alpina*, *Hutchinsia alpina* subsp. *polatschekii*, *Lepidium alpinum*, *Nasturtium alpinum*, *Noccaea alpina*, *Pritzelago alpina* subsp. *polatschekii*, *Smelowskia alpina*

oblasti: Jugoslávie, Makedonie, Německo, Polsko, Pyreneje, Střední Itálie, Španělsko, Švýcarsko

Pochází z hor jižní a střední Evropy - Španělsko, Pyreneje, střední Itálie a Makedonie. Dorůstá výšky 5 - 12cm. Kvete bílými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpina*/*Pritzelago alpina* subsp. *alpina* - Švýcarsko
- subsp. *austroalpina*
- subsp. *brevicaulis*

Hornungia aragonensis

synonyma: *Hutchinsia aragonensis*, *Hutchinsia petraea* subsp. *aragonensis*, *Hutchinsia petraea* var. *aragonensis*

Hornungia pauciflora

synonyma: *Bursa pauciflora*, *Bursa prostii*, *Capsella pauciflora*, *Hinterhubera pauciflora*, *Hutchinsia pauciflora*, *Hutchinsia prostii*, *Hymenolobus procumbens* subsp. *prostii*

oblasti: Itálie

Hornungia petraea (Řeřišník skalní)

synonyma: *Astylus petraea*, *Capsella petraea*, *Crucifera hornungia*, *Draba petraea*, *H. aragonensis*, *H. petraea* subsp. *aragonensis*, *H. petraea* subsp. *petraea*, *Hutchinsia aragonensis*, *Hutchinsia petraea*, *Lepidium petraeum*, *Nasturtium petraeum*, *Teesdalia petraea*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Estonsko, Itálie, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Německo, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Ukrajina

Roste v severní Africe, západní a střední Evropě, na sever po Švédsko a Estonsko a na východ Ukrajina a Malá Asie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (1,5 -) 2 - 15 (i 20)cm. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou zpeřeně laločnaté na 3 - 7 eliptických segmentů. Kvete v chocholíkových hroznech podobných penízům (včetně plodu) bílými květy, kališní lístky jsou dlouhé 0,5 - 0,8mm a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1mm. Plodem je vejčitá až elipsovité šesule délky 2 - 3mm a šířky 1,2 - 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. aragonensis
- subsp. petraea (Řeřišník skalní pravý)

Vyhovují mu suché skalnaté nebo štěrkové svahy na plném slunci.

Hornungia procumbens

synonyma: Bursa procumbens, Capsella berengeriana, Capsella procumbens, Capsella procumbens var. davidsonii, Capsella procumbens var. integrifolia, Crucifera procumbens, Draba pumila, Draba pumilio, Draba tenuis, Hutchinsia diffusa, Hutchinsia maritima, Hutchinsia pauciflora, Hutchinsia perpusilla, Hutchinsia procumbens, Hutchinsia puberula, Hutchinsia reticulata, Hutchinsia sinensis, Hutchinsia speluncarum, Hutchinsia tenuis, Hutchinsia tournefortii, Hutchinsiella perpusilla, Hymenolobus divaricatus, Hymenolobus erectus, Hymenolobus pauciflorus, Hymenolobus perpusillus, Hymenolobus procumbens, Hymenolobus procumbens subsp. pauciflorus, Hymenolobus procumbens subsp. procumbens, Hymenolobus procumbens var. diffusus, Hymenolobus procumbens var. integrifolius, Hymenolobus procumbens var. maritimus, Hymenolobus procumbens var. pauciflorus, Hymenolobus puberulus, Lepidium procumbens, Microcardamum tenue, Nasturtium sinense, Noccaea procumbens, Stenopetalum incisifolium, Thlaspi exile, Thlaspi procumbens

oblasti: Andalusie, Arizona, Austrálie, Britská Kolumbie, Čile, Idaho, Írán, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Manitoba, Montana, Nevada, Newfoundland, Nový Zéland, Oregon, Pákistán, Quebec, Saskatchewan, Švýcarsko, Utah, Washington, Wyoming

Roste v teplejších oblastech severní polokoule, v Čile, Austrálii a Novém Zélandu jako jednoletka. Dorůstá výšky 13 - 23 (i 30)cm. Stonek je vzpřímený a větvený. Listy vytvářejí zpravidla přízemní růžici, jsou hluboce dělené až celokrajné, obrysem úzce eliptické, max. krátce řapíkaté, dlouhé 0,8 - 1,7 (i 4)cm a široké (0,2 -) 0,5 - 1cm, horní jsou menší a přisedlé. Květenstvím je (5 -) 15 - 30tkvětý hrozen prodlužující se za plodu na až 10cm, vlastní květy mají stopku délku 0,25 - 0,8 (i 1,2)cm, průměr 1,5mm, kališní lístky délky 0,8 - 1mm, šířky 0,5mm a korunní lístky délky 0,7 - 0,8mm. Plodem je šešule délky (2 -) 2,5 - 3,5 (i 4,5)mm, šířky (1 -) 1,5 - 2mm a obsahuje 2 - 12 světlehnědých eliptických semen šířky 0,4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. pauciflorus - plodenství 4 - 20tičeté, šešule dlouhé 2mm a široké 1,8 - 2mm
- subsp. procumbens - plodenství 20tičeté, šešule dlouhé 2 - 3,5mm, široké 1 - 1,5mm
- subsp. revelierei

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hornungia-petraea/>

<https://www.rostliny.net/>