

Paronychia (Stříbřenka)

synonyma: Anychia, Plotzia, Siphonychia

čeleď: Caryophyllaceae

Roste v Evropě, Asii, severní Africe a Severní i Jižní Americe. Kvete v klubkách s palisty.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia adalia

Paronychia ahartii

oblasti: Kalifornie

Paronychia albanica

oblasti: Albánie

Paronychia amani

oblasti: Libanon, Malá Asie (Anatolie), Sýrie

Roste v Libanonu, Sýrii a Turecku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy mají úzce eliptický tvar, délku 2 - 3mm, vytváří palisty a listeny o délce 6 - 7cm.

Vyhovují ji sklaní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Paronychia americana

synonyma: Herniaria americana, Siphonychia americana, Siphonychia pauciflora

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Paronychia anatolica

Paronychia andina

Paronychia angorensis

Paronychia arabica

synonyma: P. desertorum

oblasti: Írán, Itálie, Izrael, Palestina

Patří mezi jednoletky, občas i trvalky. Vytváří mnoho rozkladitých protáhlých stonků. Listy jsou mírně obkopinaté, dlouhé 0,3 - 1,1cm, široké 1 - 2mm a na bázi klínovité. Květy mají kalich velikosti 1,5 - 2mm a má obvejčité roztržené na bázi ochlupené laloky. Semena mají velikost 0,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. breviseta - trvalka
- subsp. cossoniana
- subsp. longiseta - jednoletka

Paronychia arbuscula

oblasti: Čile

Pochází z Čile. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Mladé výhony jsou ochlupené. Listy mají úzce čárkovitý tvar a délku společnou s palisty.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Paronychia aretioides

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Pochází ze Španělska. Roste v polštářových porostech. Dorůstá výšky (1 -) 3 - 10cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou přisedlé, střežovitě se překrývají a mají délku 1 - 3mm. Kvete v klubkách o průměru 3 - 5mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízkem nebo dělením.

Paronychia argentea (Stříbřenka stříbrná)

synonyma: Chaetonychia paronychia, Ferriera mediterranea, Illecebrum paronychia, P. mauritanica, Plottzia paronychia

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, JV Evropa, JZ Asie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Palestina, Portugalsko, Řecko,

Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste ve středozeší, jižní Evropě, severní Africe včetně Kanárských ostrovů a jihozápadní Asii. Patří mezi trvalky (i jednoletky). Vytváří kobercové porosty. Pod zemí vytváří ztlustlý dřevnatější oddenek. Lodyhy jsou rozkladité, bohatě větvené, dlouhé 5 - 30 (i 50)cm a dokáží znovu zakořenit. Palisty jsou vejčité, bělavé až stříbřité. Listy jsou vstřícné, dlouze eliptické, obvejčité nebo vejčitékopinaté, špičaté, drsné, sivozelené, dlouhé 0,5 - 2cm a široké 1 - 5mm. Květenstvím je husté klubíčko o průměru 1,2 - 1,5cm, vlastní květy jsou nažloutlé, 5tičetné oboupohlavné, se stříbřitěbílými 5mm listeny na koncích výhonů, kalich má 1,5 (i 2)mm rozštěpené laloky. Plodem je nepukavá tobolka obsahující 1 hnědé semeno velikosti 1 - 1,5mm.

Vyhovují jí křoviny, písčiny, pole, okraje cest, skalní pukliny, atp. v suchu na plném slunci se suchým zimním režimem.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia argyrocoma

synonyma: *Anychia argyrocoma*, *P. argyrocoma* ssp. *albimontana*, *P. argyrocoma* subsp. *albimontana*, *P. argyrocoma* var. *albimontana*

oblasti: Georgia, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste na jihovýchodě a severovýchodě USA v kobercových porostech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou čárkovité, stříbřitě ochlupené a dlouhé 1 - 3cm. Kvete v klubkách.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia argyroloba

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech nebo kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy mají obkopinatý až podlouhlý tvar a délku do 4mm. Vytváří i palisty. Kvete v klubkách o průměru 1 - 1,2cm.

Vyhovují jí skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia baldwinii

synonyma: *P. baldwinii* subsp. *riparia*, *P. baldwinii* var. *ciliata*, *P. riparia*, *Plagidia riparia*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Virginie

Paronychia beauverdii

Paronychia boissieri

synonyma: *P. imbricata*

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou ztlustlé, protažené, střechovitě čtyřřadě poskládané. Vytváří i palisty. Kvete v 5mm klubkách s listeny.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia bornmuelleri

Paronychia brasiliiana

Paronychia bungei

oblasti: Írán

Roste v Íránu v kobercových porostech. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Stonek je plstnatý a od báze dřevnatí. Listy mají kopistovitý tvar. Kvete v klubíčkách s listeny.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia cabrerae

Paronychia caespitosa

oblasti: Írán

Paronychia camphorosmoides

Paronychia canadensis

synonyma: *Anychia canadensis*, *Anychia dichotoma*, *P. dichotoma*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Paronychia canariensis

synonyma: *Illecebrum canariensis*, *P. smithii*

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Kanárských ostrovů. Dorůstá výšky 10 - 60cm. Roste v podobě poléhavého nebo převislého polokeře. Povrch je přitiskle ochlupený. Vstřícné listy jsou přisedlé, mají kopinatý tvar a jsou také ochlupené. Kvete v klubíčkách oboupohlavnými zelenobílými květy. Plodem je nažka.

Vyhovují ji skalní pukliny nebo tenká vrstva substrátu.

Paronychia capella

Paronychia capitata

synonyma: *Anychia herniariae*, *Ferriera nivea*, *Illecebrum capitatum*, *Illecebrum niveum*, *P. atlantica*, *P. nivea*

oblasti: Andalusie, Itálie, Izrael, JV Evropa, Katalánsko, Palestina, S Afrika

Roste v jihovýchodní a jihozápadní Evropě, severní Africe a západní Asii v kobercových porostech a jako trvalka. Dorůstá výšky (1 -) 4 - 15cm. Listy mají kopinatý tvar, délku 0,3 - 1,3cm a šířku 1,2 - 2,5mm. Květenství má v průměru více než 1cm, vlastní květy jsou bílé, velikosti 3 - 5,5mm a kalich má velikost 2 - 3mm. Semena mají velikost do 1mm.

Vyhovuje ji písčité suchá půda a plné slunce.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia carica

Paronychia cataonica

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech nebo kobercích. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou ztlustlé, ochlupené, kopinaté, dlouhé 3 - 4mm. Kvete v klubičkách o průměru 0,7 - 1cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia cephalotes

synonyma: *Illecebrum cephalotes*, *P. cephalotes* subsp. *bulgarica*, *P. cephalotes* subsp. *thracica*, *P. taurica*

oblasti: Balkánský poloostrov, JV Evropa, Krym, Střední Evropa, Ukrajina, Z Asie

Roste kromě jiného třeba na Krymu a na severu Balkánského poloostrova v kobercových porostech. Patří mezi trvalky. Kmínky mají délku 5 - 15cm, na konci mohou být řídce ochlupené. Vstříčené kopinaté podlouhlé eliptické listy se špičkou mají délku 2,5 - 4mm a šířku 1mm. Spodní strana může být ochlupená. Vytváří i palisty stříbřité barvy. Kvete v hustých hlávkách o průměru 1 - 2cm. Plody mají vejčitý tvar.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia chabloziana

Paronychia chartacea

synonyma: *Nyachia pulvinata*

oblasti: Florida

Paronychia chilensis

Paronychia chionaea

Paronychia chlorothyrsa

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 3 - 12cm.

Paronychia communis

Paronychia condensata

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou dlouhé 2 - 3mm a nahuštěné, zakryté úzce vejčitými palisty. Kvete v klubkách o průměru 5 - 7mm.

Vyhovují ji dobře propustné hluboké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia congesta

oblasti: Texas

Paronychia cymosa

oblasti: Katalánsko

Paronychia davisii

Paronychia depressa

synonyma: *P. brevicuspis*, *P. depressa* var. *brevicuspis*, *P. depressa* var. *diffusa*, *P. diffusa*, *P. jamesii* var. *depressa*, *P. sessiliflora* var. *brevicuspis*

oblasti: Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Wyoming

Roste v USA v kobercově rostoucích polokeřích. Dorůstá výšky 8 - 15cm. Lodyhy jsou drsné. Kožovité čárkovité listy se špičkou mají délku 0,8 - 1,5cm. Kvete v klubkách o průměru 0,7 - 2,5cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia drummondii

synonyma: *P. drummondii* subsp. *parviflora*

oblasti: Louisiana, Oklahoma, Texas

Paronychia dudleyi

Paronychia echinulata

synonyma: Chaetonychia echinata

oblasti: Andalusie, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Palestina

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (2 -) 6 - 10 (i 15)cm. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý a může být na bázi větvený. Listy jsou obkopynaté až obvejčité, načervenalé a na okraji roztřepené. Květenství má průměr 3 - 8mm a vlastní kalich má velikost 2 - 2,5mm. Semena nejsou známá.

Paronychia ellenbergii

Paronychia erecta

synonyma: Odontonychia corymbosa, Odontonychia erecta, P. erecta var. corymbosa, Siphonychia corymbosa, Siphonychia erecta

oblasti: Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi

Paronychia euphratica

Paronychia fasciculata

Paronychia fastigiata

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Paronychia franciscana

oblasti: Kalifornie

Paronychia fusciflora

Paronychia galatica

Paronychia haggariensis

Paronychia herniarioides

synonyma: *Gastronychia herniarioides*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Paronychia hieronymi

Paronychia jamesii

synonyma: *P. jamesii* var. *hirsuta*, *P. jamesii* var. *parviflora*, *P. jamesii* var. *praelongifolia*, *P. wardii*

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Mexiko, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Wyoming

Roste od severozápadu USA po jih USA a Mexiko v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 35cm. Lodyhy jsou drsné, větvené a ochlupené. Kožovité listy mají čárkovitý tvar délky 0,7 - 2,5cm a jsou také ochlupené. Kvete v klubkách o průměru 1 - 2cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia jonesii

oblasti: Texas

Paronychia jordanica

oblasti: Jordánsko

Paronychia kapela (Stříbřenka klubíčkatá)

synonyma: *Illecebrum capitatum*, *Illecebrum kapela*, *P. capitata*, *P. pseudoaretioides*, *P. serpyllifolia*

oblasti: Andalusie, Francie, Itálie, Jugoslávie, Katalánsko, Rumunsko, S Afrika

Roste v jižní Evropě v pohořích Španělska, Francie, Itálie, Jugoslávie a Rumunska. Dorůstá výšky (3 -) 5 - 10 (i 25)cm. Roste v polštářových porostech. Lodyhy jsou plazivé, v mládí ochlupené. Vystávají kopinaté palisty. Vstřícné tuhé lesklé listy mají eliptický až obvejčitý tvar délky 2 - 5mm, šířky 1 - 2,5mm. Kvete v kulovitém 0,8 - 1,5 (i 2)cm květenství na koncích výhonů zelenobílými květy. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *baetica*
- subsp. *kapela*
- subsp. *serpyllifolia*

Vyhovují ji sutě, skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia kayseriana

Paronychia kemaliya

Paronychia kotschyana

Paronychia kurdica (Stříbřenka kurdistánská)

synonyma: *Illecebrum cephalotes*, *P. haussknechtii*, *P. montis-munzur*, *P. nivea*, *P. splendens*

oblasti: Arménie, Írán, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze, Malé Asii, Arménii, Kurdistánu a Íránu v kobercových porostech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Kmínky dorůstají délky 2 - 10cm, dřevnatí, jsou vystoupavé a řídce ochlupené. Listy mají dlouze čárkovitý až obkopinatý tvar se špičkou, délku 5 - 7mm, šířku 1mm a jsou mírně ochlupené. Vytváří i palisty. Kveté v hustých ochlupených svazečcích o průměru 0,5 - 1cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia libertadiana

Paronychia limaei

Paronychia lindheimeri

synonyma: *P. chorizanthoides*, *P. lindheimeri* var. *longibracteata*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Paronychia longiseta

Paronychia lundelliorum

oblasti: Texas

Paronychia lycica

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy mají obvejčitý tvar, drsný povrch a délku 3 - 4mm. Vytváří 2 - 3mm palisty. Kvete v klubkách.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia macbridei

Paronychia maccartii

oblasti: Texas

Paronychia macedonica

oblasti: Jugoslávie, Makedonie

Paronychia macrosepala

synonyma: *P. capitata* subsp. *macrosepala*, *P. euboea*, *P. insularum*

oblasti: Izrael, Jordánsko, JV Evropa, Kréta, Kypr, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Palestina, Řecko, Sicílie, Sýrie

Roste ve východním středozeří, Řecku, Turecku, Kypru, Sicílii, Maltě a Izraeli. Vytváří kobercové porosty. Dorůstá výšky 2 - 10cm. Lodyhy jsou poléhavé a větvené, červeně obarvené. Vstřícné dužnaté listy mají eliptický až obkopinatý tvar délky 3 - 5mm a šířky 1,5 - 2,3mm. Vytváří i palisty bělavé barvy. Kvete v klubíčkách o průměru více než 1cm na koncích výhonů žlutozelenými květy velikosti 4 - 5mm s bílými lesklými až 6mm listeny a kalichem velikosti 2 - 3mm s ochlupenými okraji. Plodem je tobolka obsahující semena velikosti do 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cretica*
- var. *insularum*
- var. *macrosepala*

Vyhovují ji pobřežní písčiny a duny, šterky, skalní pukliny, atp. v chudé dobře propustné půdě na plném slunci se suchým zimním režimem.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia mandoniana

Paronychia maroccana

synonyma: *P. kapela* var. *hirta*

oblasti: Maroko

Paronychia mesopotamica

Paronychia mexicana

Paronychia microphylla

synonyma: *P. arequipensis*

oblasti: Bolívie, Čile, Peru

Roste v Bolívii, Čile a Peru v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou eliptické, hrotené a ochlupené. Dosahují délky 5mm. Vytváří i 5mm také ochlupené palisty.

Vyhovuje ji písčité chudá propustná půda, plné slunce a sucho.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia montana

synonyma: *Anychiastrum montanum*, *P. fastigiata* var. *pumila*

oblasti: Alabama, Georgia, Jižní Karolína, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Paronychia monticola

synonyma: *P. nudata*

oblasti: Texas

Paronychia mughlaii

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech nebo kobercích. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Povrch je hustě ochlupený. Listy mají obvejčitý tupě zakončený tvar a délku 4 - 6mm. Vytváří i kopinaté palisty. Kvete v klubkách s 5 - 7mm listeny.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia muschleri

synonyma: *P. rigida*

Paronychia palaestina

oblasti: Palestina

Roste jako trvalka. V průměru dosahuje 10 - 20cm. Stonky jsou poléhavé až vystoupavé. Listy jsou kopinaté až eliptické, ochlupené, dlouhé 3 - 8mm a široké 1 - 2mm. Květenství má v průměru 5mm a vlastní květy mají kalich velikosti 2 - 3mm. Semena jsou hnědá a velká 1mm.

Paronychia paphlagonica

Paronychia patula

synonyma: *Siphonychia diffusa*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Paronychia peruviana

Paronychia polygonifolia

synonyma: *Chaetonychia polygonifolia*, *Ferriera polygonifolia*, *Illecebrum polygonifolium*, *Plottzia polygonifolia*

oblasti: Andalusie, Itálie, JV Evropa, Katalánsko, S Afrika, Z Asie

Roste v jižní Evropě, severní Africe a západní Asii v kobercových porostech. Dorůstá výšky (1 -) 3 - 15cm. Listy mají obkopinatý až podlouhlý tvar se špičkou, mírně pilový okraj a jsou seskupené do svazečků. Vytváří i menší palisty. Kvete v klubkách.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, řízkami nebo dělením.

Paronychia pontica

synonyma: *P. cephalotes* subsp. *pontica*

Paronychia pulvinata

synonyma: *P. pulvinata* var. *longiaristata*, *P. sessiliflora* subsp. *pulvinata*

oblasti: Kolorado, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Roste ve vysokých polohách od severozápadu po jih USA v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Lodyha dřevnatí. Listy mají eliptický tvar s tupou špičkou.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia rechingeri

Paronychia revoluta

Paronychia rouyana

synonyma: *P. echinulata* subsp. *rouyana*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 5 - 10cm.

Paronychia rugelii

synonyma: *Odontonychia interior*, *P. rugelii* var. *interior*, *Siphonychia interior*, *Siphonychia rugelii*

oblasti: Florida, Georgia

Paronychia saxatilis

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste ve vysokých polohách Turecka v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy mají obvejčitý až podlouhlý tvar. Kvete v klubíčkách s výraznými listeny.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia serpyllifolia

Paronychia sessiliflora

oblasti: Alberta, Arizona, Jižní Dakota, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Wyoming

Roste od západní Kanady po jihozápad USA ve vyšších polohách v kobercově rostoucích polokeřích. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou čárkovité, špičaté, žlutozelené barvy a délky 4 - 6mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia setacea

synonyma: *P. lundellorum*, *P. setacea* var. *longibracteata*

oblasti: Texas

Paronychia setigera

synonyma: *Herniaria setigera*, *P. andina*, *P. chilensis* var. *andina*

Paronychia sinaica

synonyma: *P. moabitica*

oblasti: Izrael, Palestina

Patří mezi trvalky. Dorůstá délky 5 - 12cm. Stonky jsou vystoupavé a větvené již od dřevnaté báze. Listy jsou kopinaté až čárkovité, špičaté, dlouhé 0,4 - 1cm a široké 1 - 2mm. Květenství má v průměru 0,5 - 1cm a vlastní květy mají kalich velikosti 2 - 3mm. Semena jsou bleděhnědá a velká 1,5 - 2mm.

Paronychia sintenisii

Paronychia splendens

oblasti: Írán

Paronychia suffruticosa

synonyma: *Herniaria polygonoides*, *Herniaria suffruticosa*, *Illecebrum suffruticosum*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 10 - 35cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *suffruticosa*
- subsp. *hirsuta*

Paronychia taurica

Paronychia tunisiana

oblasti: Tunisko

Paronychia turcica

Paronychia velata

Paronychia virginica

synonyma: *P. parksii*, *P. scoparia*, *P. virginica* var. *parksii*, *P. virginica* var. *scoparia*

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Maryland, Missouri, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Paronychia weberbaueri

synonyma: *P. polygonoides*

Paronychia wilkinsonii

oblasti: Texas

Další informace:

<http://botany.cz/cs/paronychia-canariensis/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=41930>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=41931>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Paronychia.htm>

<http://www.pulsatilla.bluefile.cz/?p=73>

<https://www.rostliny.net/>