

Heliamphora (Heliamfora)

čeleď: Sarraceniaceae

Roste na stolových horách od Venezuely po Brazílii na Guyanské vysočině v podobě masožravé trvalky. I v přírodě vytvářejí mezidruhové křížence. Výška květních stonků bývá 10 - 50 (i 60)cm. Vytváří trs přízemních láček vytvořených z načervenalých listů. Kvete drobnými bílými květy, které později růžovějí.

Vyžadují trvale vysokou vzdušnou vlhkost, teplotu do 25°C a vlhký substrát. Ten může tvořit směs písku a rašeliny s rašeliníkem nebo písek můžete vyměnit za perlit. K zálivce se používá dešťová voda o pokojové teplotě. Potřebuje intenzivní osvětlení, u nás se musí přisvěcovat. Tyto podmínky dělají z rostlin velmi náročné na pěstování. Teplota nesmí klesnout pod 5°C.

Množí se semeny nebo odnožemi nebo dělením oddenků.

Heliamphora chimantensis

oblasti: Venezuela

Patří mezi trvalky. 20 - 35cm vysoké láčky tvoří válcovitá část zakončená trychtýřovitým hrdlem s 1 - 2cm širokým a 2 - 2,5cm dlouhým lžičkovitým víčkem. Vnější strana je bíle ochlupená. Kvete na 60 - 65cm stonku 3 - 5 bílými nebo narůžovělými květy. Plodem je 3pouzdrý semeník s nepravidelně okřídlenými semeny.

Heliamphora ciliata

Heliamphora elongata (Heliamfora protáhlá)

oblasti: Venezuela

Vytváří až 32cm vysoké láčky, které jsou u báze vyduté, pokračují v pravidelném válcovitém tvaru a jsou zakončený 3,5 - 4cm vyústěním vejčitého tvaru s helmovitým víčkem tmavěčervené barvy. Vnější strana láčky je v horní části jemně bíle ochlupená. Kvete na až 50cm stonku 2 - 5ti bílými nebo načervenalými květy. Plod je 3pouzdrý, obsahuje vejčitá nepravidelně okřídlená semena.

Vyhovuje ji vysoká vlhkost nebo dokonce i přímo voda. Růst je pomalý.

Heliamphora exappendiculata (Heliamfora promačkaná)

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele.

Vyhovují ji vlhká místa s teplotami kolem 15°C a přítomnost lišejníků.

Heliamphora folliculata (Heliamfora váčkatá)

oblasti: Venezuela

Heliamphora glabra

Heliamphora heterodoxa

synonyma: H. heterodoxa f. glabra, H. heterodoxa var. glabra

oblasti: Brazílie, Guyana, Venezuela

Vyskytuje se na stolových horách v Guyaně, Brzílii a Venezuele. Listy vytváří nálevkovitou láčku délky 15 - 30 (i 40)cm, šířky 5cm a válcovitá dutina se zúžením je zakončená červeným drobnějším víčkem. Kromě láček vytváří žluté listy. Kvete bílými až růžovými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. heterodoxa - roste pouze na Ptari Tepui

Heliamphora heterodoxa x Heliamphora ionasi

Heliamphora hispida

Heliamphora huberi

Heliamphora ionasi (Heliampfora Jonášová)

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele. Ve svém druhu má největší až 50cm dlouhé láčky. Kvete bílými květy.

Heliamphora minor (Heliampfora menší)

oblasti: Brazílie, Venezuela

Roste na stolových horách od Venezuely po Brazílii. Patří mezi trvalky. Roste na stolových horách v Jižní Americe. Láčky mají výšku 8 - 20cm, šířku 3 - 8cm, jsou zelené a červeně žilkované. Tvoří je břichovitá báze pokračující válcem a zakončené nálevkou s víčkem o velikosti do 1cm. Kvete na 20 - 40cm stonku bílými nebo růžovými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. pilosa

Potřebuje trvale vysokou vzdušnou vlhkost, intenzivní osvětlení a teploty do 30°C, ale ani k této hranici by jste se neměli dostávat. Ideální je 15 - 25°C. Substrát by neměl být výživný, vystačí si se směsí rašelini a písku, důležitý je také vysoký podíl lišejníku.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Heliamphora neblinae

Heliamphora nutans (Heliamfora níčí)

oblasti: Guyana, S Brazílie, Venezuela

Roste téměř na vrcholu náhorní plošiny Roraimy jako masožravá rostlina. Listy má zkroucené do kornoutu a mají délku 10 - 20cm. Kvete převislými zelenobílými, později růžovými zvonkovými převislými květy s červenými listeny na 15 - 30cm stonku.

Heliamphora pulchella (Heliamfora přepěkná)

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Tequila'

Množí se dělením trsů.

Heliamphora sarracenioides (Heliamfora špirlicovitá)

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele.

Vyhovuje ji chudá půda.

Heliamphora tatei (Heliamfora Tateova)

synonyma: *H. macdonaldae*, *H. tatei* f. *macdonaldae*, *H. tatei* var. *macdonaldae*, *H. tyleri*

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele. Vytváří dřevitý (i větvený) kmínek.

Heliamphora uncinata

Další informace:

<http://carniflora.cz/?heliamphora-minor,71>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Heliamfora>

<http://mrjs.iplace.cz/menu/rody-mr/heliamphora>

<http://www.darwiniana.cz/vamr/?page=rostliny&rod=Heliamphora>

<http://www.freewebs.com/trainxpress/heliamphoraheterodoxa.htm>

<http://www.sarracenia.cz/navody/heliamphory/index.html>

<https://www.rostliny.net/>