

Borojoa

čeleď: Rubiaceae

Pochází z tropické Ameriky z Kostariky, Panamy, Kolumbie a Venezuely. Patří mezi menší dvoudomé stromy. Vytváří palisty. Vstřícné listy mohou být i křížmostojné, mají řapíky, okraj celokrajný a mohou dosahovat větších velikostí. Kvete samostatným květenstvím s 1 - 3mi páry listenů. Vlastní květy jsou jednopohlavné. Samčí jsou 4 - 8mi dílné, samičí 6 - 8mi dílné. Nejznámějším druhem je *B. patinoi*.

Borojoa atlantica

synonyma: *Alibertia atlantica*

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Kostarice a Panamě v podobě stromu. Dorůstá výšky až 10m. Palisty mají délku 1cm a šířku 5mm, jsou opatřené pochvou délky 2 - 5mm. Listy vyrůstají i na kmíncích, řapíky mají délku 1 - 2,6cm, jsou olysávající, čepel je dlouhá 12 - 26cm, šířka 7 - 16cm, tvar je široce eliptický s krátkou špičkou a tupou bází. Spodní strana má 7 - 11 žilek s chomáčky chloupků. Květenství není známé. Plody mají délku 2,7 - 6cm, jsou kulaté, mírně vejčité.

Borojoa claviflora

synonyma: *Alibertia claviflora*, *Cordia claviflora*

Borojoa duckei

Borojoa panamensis

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Kostarice a Panamě v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 13m při tloušce kmene až 25cm. Výhony jsou olistěné. Vytváří zašpičatělé palisty délky 1,2 - 2,8cm a šířky 0,5 - 1,6cm. Listy mají 1,3 - 3cm řapíky, čepel je holá, dlouze až široce eliptická s tupou bází a špičkou, délka dosahuje 13 - 38cm a šířka 7 - 17cm. Spodní strana má ochlupené 5 - 12ti četné žilkování. Květenství tvoří 2 - 9 přisedlých samčích květů, samičí vyrůstají samostatně s 1cm palisty. Barva květů je bílá. Plody jsou kulaté, žlutohnědé, dlouhé 5 - 11cm a v průměru mají 6 - 10cm. Obsahují 4 - 8mm široká semena.

Borojoa patinoi (Borojó)

synonyma: *Alibertia patinoi*

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Panama

Roste na severozápadě Kolumbie, v Ekvádoru a Panamě. Patří mezi středně vysoké tropické stromy. Dorůstá výšky 3 - 5m. Kvete úzce trubkovitými květy v barvě béžovobílé. Plody mají průměr až 12cm, jsou zakulacené, červenohnědé a váží 3/4 - 1kg. Každé obsahuje 90 - 640 semen, dužina je jedlá a má barvu červenou nebo hnědočervenou. Využívá se k přípravě vína, dezertů, džemů, atp. a v tradiční medicíně i jako afrodisiakum.

Potřebuje teplo a vysokou vzdušnou vlhkost.

Borojoa sorbilis

synonyma: Alibertia sorbilis, Thieleodoxa sorbilis

Borojoa stipularis

synonyma: Alibertia stipularis, Thieleodoxa stipularis

Borojoa venezuelensis

synonyma: B. universitatis

Borojoa verticillata

synonyma: Alibertia verticillata, Thieleodoxa verticillata

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Borojo>

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4552>

<https://www.rostliny.net/>