

Erica curviflora

synonyma: *Erica bucciniformis*, *Erica burchellii*, *Erica coccinea*, *E. var. burchellii*, *E. var. diffusa*, *E. var. sulcata*, *E. var. versatilis*, *Erica cuspidigera*, *Erica fastuosa*, *Erica ignescens*, *Erica laniflora*, *Erica procera*, *Erica simpliciflora*, *Erica sordida*, *Erica sulcata*, *Erica tubiflora*, *Ericoides burchellii*, *Ericoides curviflorum*, *Ericoides tubiflorum*

čeleď: Ericaceae

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 1,6m. Větve jsou tlusté, metlovité a ochlupené. Listy vyrůstají ve 4četných přeslenech, jsou čárkovité až mírně kopinaté, vzpřímené, mohou být stočené, střechovité, ochlupené a dlouhé 3 - 7mm. Kvete po 1 (i 2 - 4)ks, koruna je trubkovitá, zpravidla ochlupená, červená, oranžová až žlutá, dlouhá 2,2 - 2,6 (i 3,8)cm a cípy jsou tupé, dlouhé 3,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *splendens*/*E. conspicua*/*E. splendens* - výška 30 - 60cm; větve mají husté krátké výhony; listy 3hranné, hladké, dlouhé 8mm; květy mají kyjovitou zahnuté jemně ochlupenou červenožlutou nebo žlutou korunu

<https://www.rostliny.net/>