

Prunus spinosa (Slivoň trnka)

synonyma: *Druparia spinosa*, *Prunus acacia*, *Prunus acacia-germanica*, *Prunus domestica* var. *spinosa*, *Prunus moldavica*, *Prunus stepposa*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Anglie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Idaho, Írán, Irsko, Itálie, JZ Rusko, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Korsika, Kosovo, Krym, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Moldávie, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Tunisko, Ukrajina, Wales, Washington, Z Rusko

Roste v Evropě, západní Asii a severní Africe v podobě opadavého rozložitého hustého křivolakého trnitého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 4 (i 8)m a šířky 6m. Má velmi tmavý kmen i větve. Větve jsou v mládí ochlupené, později hnědočervené a opatřené mnoha kolci (přeměněné větve). Palisty jsou drobné, úzké, pilovité a delší řapíku. Listy jsou střídavé, občas zdánlivě ve svazcích, obvejčité, eliptické nebo kopinaté, krátce špičaté, 1 - 2x pilovité, tmavězelené, mírně svrasklé, dlouhé 2 - 4 (i 5)cm, široké 1 - 2cm, na bázi klínovité, spodní strana je v mládí ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1 (i 1,2)cm. Kvete po 1 - 2ks bílými květy průměru 1,5cm s červeně zakončenými tyčinkami ještě před olistěním na 5 - 9mm stopce, kališní lístky jsou na okraji žláznatě zubaté, dlouhé 1 - 2mm, korunní lístky jsou dlouhé (0,4 -) 0,6 - 0,8 (i 1)cm. Plodem je peckovice - trnka kulatého tvaru dozrávají na konci léta, mají 5 - 8mm stopku, modročernou ojíněnou barvu a průměr (0,7 -) 1 - 1,5 (i 2)cm. Konzumovat je lze až po projití mrazem, protože jinak mají velmi trpkou chuť. Lze ji použít i jako živý plot. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cerasina* - stopky a listy na spodní straně ochlupené; stopky květů ochlupené; plodem je nasládlá peckovice velikosti 1,4 - 1,7cm, pecky velké 1,2 - 1,4cm
- subsp. *dasyphylla* - listy na spodní straně ochlupené; květní stopky ochlupené, češule ochlupená; plodem je 1,2 - 1,5cm kyselá trpká peckovice, pecky velké 7 - 9mm
- subsp. *fruticans* - keř výšky 2 - 3m; listy obvejčité až vejčité eliptické, dlouhé 4 - 5cm, široké 2 - 3cm; kvete po 1 - 2ks, v průměru mají 2cm; plodem je kulatá peckovice průměru 2cm a barvy černofialové
- subsp. *megalocarpa* - silně trnité větve; listy malé, úzké, obkopinaté, dlouhé 3cm, široké 1,5cm, obě strany holé; plodní stopky dlouhé 1 - 1,2cm, peckovice velikosti 1,5 - 1,8cm, kyselá, trpká, pecka svrasklá
- subsp. *moravica* - protažené prutovité větve; listy větší, řapíky ochlupené; plodní stopky dlouhé do 5mm; plodem je sladká ojíněná tmavá až černá lesklá peckovice průměru 1,5 - 1,8cm
- 'Plena'/var. *plena* - nepravidelně řídce polokulovitý keř; větve šikmo ploše vystoupavé, obrys nerovnoměrný; výška 2m; bílé plnokvěté květy velikosti 1cm
- 'Purpurea'/var. *purpurea* - kompaktní keř až nízký strom; mladé listy červené, později zelené s načervenalým okrajem, spodní strana růžovofialová, holá; květy bílorůžové až růžové
- subsp. *spinosa* - listy holé nebo olýsalé; květy malé, květní stopka i kalich holý; plodem je kyselá kulovitá peckovice průměru 0,8 - 1cm
- 'Variegata' - nepravidelně řídce polokulovitý keř; větve šikmo ploše vystoupavé, obrys nerovnoměrný; výška 2m; listy bíle pestré

Vyhovují ji vápenaté půdy a přímé slunce, ale není to podmínkou. Roste při okrajích lesů, v křovinách, sutích, atp. Od kořenů se rychle rozrůstá. Dobře se prořezává.

Množí se odkopky nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>