

Oxalis frutescens

synonyma: *Acetosella bahiensis*, *Acetosella diffusa*, *Acetosella distans*, *Acetosella fasciculata*, *Acetosella frutescens*, *Acetosella neaei*, *Acetosella pentantha*, *Acetosella pilosissima*, *Acetosella psilotricha*, *Acetosella schomburgkiana*, *Acetosella tephrodes*, *Lotoxalis fasciculata*, *Lotoxalis frutescens*, *Lotoxalis glabrata*, *Lotoxalis neaei*, *Lotoxalis pentantha*, *Lotoxalis psilotricha*, *Lotoxalis tephrodes*, *Oxalis angustifolia*, *Oxalis avilensis*, *Oxalis bahiensis*, *Oxalis berlandieri*, *Oxalis camporum*, *Oxalis chacoensis*, *Oxalis charaguensis*, *Oxalis coarctata*, *Oxalis coccinea*, *Oxalis cruzeirensis*, *Oxalis descolei*, *Oxalis diffusa*, *Oxalis distans*, *Oxalis fasciculata*, *O. subsp. frutescens*, *O. subsp. pentantha*, *O. var. cicatricosa*, *O. var. margaritensis*, *Oxalis glabrata*, *Oxalis glaucifolia*, *Oxalis guatemalensis*, *Oxalis harmsiana*, *Oxalis herzogii*, *Oxalis hispida*, *Oxalis jahnii*, *Oxalis leptophylla*, *Oxalis mairaryensis*, *Oxalis neaei*, *Oxalis neaei var. glabrata*, *Oxalis nodulosa*, *Oxalis pentantha*, *Oxalis pentantha var. humboldtii*, *Oxalis pilosissima*, *Oxalis plumieri*, *Oxalis psilotricha*, *Oxalis schomburgkiana*, *Oxalis schomburgkiana var. leiocarpa*, *Oxalis sublignosa*, *Oxalis tephrodes*

čeleď: Oxalidaceae

oblasti: Argentina, Belize, Guatemala, Karibik, Kostarika, Mexiko, Nové Mexiko, Salvador, Texas

Roste od Mexika po tropickou Jižní Ameriku v podobě vzpřímené dřevnatějící trvalky. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Kmínky mohou být větvené a zpravidla ochlupené. Listy jsou střídavé anebo ve svazečcích, dlouze řapíkaté, 3četné, vlastní lístky podlouhlé, kopinaté nebo vejčité, vykrojené nebo zakulacené, mohou ochlupené, dlouhé 2,5cm, široké 1cm, báze tupá, spodní strana světlejší, zpravidla ochlupená. Květenství je úžlabní, vzpřímené, má až 4cm stopku, vlastní květy mají 3 - 5mm stopky, okolíky jsou 5četné, kališní lístky kopinaté, dlouhé 4 - 5mm a ochlupené. Plodem je podlouhlá nebo vejčitá ochlupená tobolka délky 4 - 6mm a obsahuje eliptická hnědá semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *angustifolia* - od Mexika po Argentinu; bylinný polokeř až keře; výška do 40cm; větve vzpřímené nebo vystoupavé, na bázi dřevnaté; listy střídavé, vstřícné nebo přeslenité, zpeřené, 3četné, řapíky dlouhé 1 - 4cm, drobně ochlupené, řapíčky malé, vlastní lístky jsou vejčité až 3úhlé, postranní lístky více podlouhlé, asymetrické, hustě ochlupené, dlouhé 0,7 - 4,5cm, široké 0,3 - 2cm a 2x delší než postranní; květenství je 1 - 15tičetné, má až 3,5cm stopku, listence délky 1mm, květy mají 3 - 6mm stopku, vlastní květy jsou žluté, kališní lístky podlouhlé, dlouhé 2,5 - 5mm, široké 1mm; plody jsou vejčité až podlouhlé, dlouhé 5 - 8mm, široké 3mm, semena jsou vejčitá s hrotem, světlehnědá a dlouhá 1,5 - 2mm

<https://www.rostliny.net/>