

Lecythis corrugata

synonyma: *Chytroma corrugata*, *Cymbopetalum venosum*, *Eschweilera corrugata*

čeleď: Lecythidaceae

oblasti: Amazonas, Francouzská Guyana, Guyana, Venezuela

Roste v podobě stromu. Dorůstá výšky až 35m. Mladé větve jsou šedé, hladké nebo i trochu rozpukané se svislými lenticelami. Borka je šedohnědá, vlastní dřevo žlutobílé, jádrové hnědé. Listy jsou holé, na spodní straně krátce ochlupené na centrálním žeburu, navazuje na něj 11 - 23 párů žilek. Tvar je eliptický, může být i obkopynatý, konec špičatý až tupý, báze špičatá až tupá také. Okraj je celokrajný, mírně podvinutý a mají řapíky délky 1 - 2,5cm. Celková délka je 8 - 25cm a šířky 4 - 10cm. Kvete v latnatých hroznech se 4 - 25cm vřetenem. Květy mají 1 - 5mm stopky, v průměru mají 2,5 - 3cm, 6 okvětních lístků růžové, fialové nebo růžovofialové barvy délky 1,1 - 1,9cm a šířky 0,8 - 1,4cm. Semeníky mají 4 pouzdra se 4 - 8mi vajíčky. Plody mají široce kuželovitý až kulovitý tvar délky 2,5 - 5cm, šířky 2,5 - 6cm a má 3 - 4mm slupku. Obsahují hnědá semena délky 2,2 - 2,5cm a šířky 1,5 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *corrugata* - Venezuela, Guyana, Francouzská Guyana, východ Amazonie; borka se podélně odlupuje; dřevo je odolné; čepel eliptická až obkopynatá čepel délky 9 - 25cm, šířky 4 - 9cm, 10 - 19 párů žilek

- subsp. *rosea* - Venezuela, Brazílie; úzce až široce eliptické listy délky 8 - 18,5cm, šířka 4 - 9,5cm se 17 - 23 páry žilek

<https://www.rostliny.net/>