

Lecythis poiteau

synonyma: Chytroma foetida, Eschweilera poiteau, Jugastrum poiteau, Lecythis racemiflora

čeleď: Lecythidaceae

oblasti: Amazonas, Francouzská Guyana, Surinam

Roste v Surinamu, Francouzské Guyaně a Amazonii v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky až 35m. Mladé větve mají v průměru pouze 1,5 - 2,5mm a jsou mírně hranaté. Borka je svisle rýhovaná, kůra je žlutá. Listy jsou papírové, později kožovité, žilnatinu tvoří 19 - 26 párů žilek, čepel je eliptická, občas podlouhlá, konec zašpičatělý, báze tupá až sbíhavá, okraj drobě vroubkovaný, celková délka je 13 - 26cm, šířka 5 - 10cm. Řapíky mají délku 0,8 - 1,3cm. Kvete v hroznu s vršenem délky 12 - 20cm a je tvořený 2 - 7 květy. Ty mají listeny i listence, v průměru mají 11cm, 6 okvětních lístků bílé nebo nazelenalé barvy délky 4cm a šířky 3,5cm. Semeníky jsou 3 - 5ti pouzdré po 14 - 28 vajíčkách. Plod má kulovitý nebo smáčknutý tvar délky 3,5 - 8cm a šířky 5 - 10,5cm.

<https://www.rostliny.net/>