

Thylacospermum caespitosum

synonyma: *Arenaria caespitosa*, *Arenaria rupifraga*, *Bryomorpha rupifraga*, *Periandra caespitosa*, *Thylacospermum rupifragum*

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Gansu, Himálaj, Kašmír, Kazachstán, Kyrgyzstán, Ladak, Nepál, Qinghai, Sichuan, Ťan-šan, Xinjiang, Xizang (Tibet)

Roste v horách Indie, Nepálu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu a Číně v pichlavých polštářových porostech o průměru 20 (i 50)cm z dřevnatějících vytrvalých bylin. Dorůstá výšky 5cm. Stonek je hustě větvený a dřevnatý. Listy jsou tuhé, vejčité, pichlavé, dlouhé 2 - 3,5mm a široké 2 - 2,5mm. Kvete bílými nebo nažloutlými 5 (i 4)četnými květy na vrcholcích stonků v zubatém kalichu. Plodem je lesklá žlutá tobolka obsahující 6 hnědých ledvinovitých semen délky 1,5mm.

Postřebuje vysokohorské prostředí a suťovitou půdu nebo pastviny a plné slunce.

Množí se semeny nebo letními řízků.

<https://www.rostliny.net/>