

Citrus reticulata (Mandarinka obecná)

synonyma: Citrus aurantium f. deliciosa, Citrus aurantium subsp. suntra, Citrus aurantium var. tachibana, Citrus chrysocarpa, Citrus crenatifolia, Citrus crenatifolia var. lycopersiciformis, Citrus dao-xianensis, Citrus deliciosa, Citrus depressa, Citrus erythrosa, Citrus himekitsu, Citrus koozi, Citrus lycopersiciformis, Citrus madurensis var. deliciosa, Citrus mangshanensis, Citrus nippokoreana, Citrus nobilis var. deliciosa, Citrus nobilis var. major, Citrus nobilis var. spontanea, Citrus nobilis var. tachibana, Citrus nobilis var. vangasy, Citrus otachihana, Citrus papillaris, Citrus papillaris var. chrysocarpa, Citrus ponki, Citrus poonensis, C. subsp. deliciosa, C. subsp. tachibana, C. subsp. unshiu, C. var. austera, C. var. chrysocarpa, Citrus succosa, Citrus suhuiensis, Citrus sunki, Citrus tachibana, Citrus tangerina, Citrus tankan, Citrus tankan f. haili, Citrus unshiu, Citrus vangasy, Citrus x aurantium f. deliciosa, Citrus x aurantium var. tachibana, Citrus x nobilis var. deliciosa, Citrus x nobilis var. koozi, Citrus x nobilis var. papillaris, Citrus x nobilis var. ponki, Citrus x nobilis var. poonensis, Citrus x nobilis var. sunki, Citrus x nobilis var. unshiu

čeleď: Rutaceae

oblasti: Austrálie, Florida, Indie, Japonsko, JV Asie, JV Čína, Pákistán, Portoriko

Roste v Číně nebo Japonsku v podobě stálezelené krátce trnitého až beztrnného keře až stromy. Dorůstá výšky (3,5 -) 4 - 7,5 (i 8)m. Větve bývají zpravidla beztrnné. Střídavé listy jsou eliptické nebo kopinaté, kožovité, tmavězelené s téměř neznatelně pilové, dlouhé (5 -) 6 - 8 (i 13)cm, široké 2 - 3(i 5)cm a řapíky je úzce křídlaté, článkované a dlouhé 7mm. Kvete drobnějšími bílými květy v paždí listů samostatně nebo ve svazečcích, kalich je asymetricky 3 - 5laločný, korunní lístky jsou dlouhé do 1,5cm a má 20 - 25 tyčinek. Plody jsou zploštěle kulovité, žluté až oranžové, načervenalé nebo červené, kulovité nebo zploštěle kulovité, průměru 5 - 8 (i 10)cm, kůra je na rozdíl od ostatních citrusu od dužiny téměř oddělena, sladká dužina je oranžová a semena bývají vejčitá a špičatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bendiza'
- 'Cangor Ortanique'
- 'Corsica 1'
- 'Chahara'
- 'Ichimaru'
- 'Iwasaki'
- 'Kawano Wase'
- 'Kelasurskij'
- 'Kuno'
- 'Miagawa nucellare'
- 'Owari'
- 'Sláva Vavilova'
- 'Wakay Na'
- 'Wakayma'
- 'Zorana'

Vyhovuje ji vlhko a vysoká teplota.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>