

Romulea

čeleď: Iridaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest domnělého zakladatele Říma Romula. Roste v Evropě, středozemí, Arabském poloostrově a jižní Africe. Pod zemí vytváří drobné hlízky se síťovanou hnědou slupkou. Listy jsou čárkovité, 4hranné. Stonek může být řídce větvený. Kvete 1 - 2ma zvonkovitými 6tičetnými krátce trubkovitými květy s listeny. Plodem je vejčitá nebo podlouhlá tobolka.

Množí se dceřinými hlízkami.

Romulea albiflora

Romulea albomarginata

Romulea amoena

oblasti: Kapsko

Pochází z Kapska. Kvete velkými červenými květy.

Romulea antiatlantica

Romulea aquatica

oblasti: Kapsko

Roste v Kapsku.

Vyhovuje ji pravidelně mělce zaplavovaná půda.

Romulea arnaudii

Romulea atrandra

Romulea austini

Romulea autumnalis

synonyma: R. rosea var. speciosa

Romulea barkerae

Romulea biflora

synonyma: R. ambigua var. biflora

Romulea bifrons

synonyma: R. bifrons var. rosea, R. daveauana, R. gaditana var. bifrons

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 9 - 15cm. Cibule má průměr 0,7 - 1,5cm.

Romulea bocchierii

oblasti: Itálie

Romulea bulbocodium (Romulea hlíznatá)

synonyma: Crocus bulbocodium, Ixia bulbocodium, Trichonema bulbocodium

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Libanon, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko

Vyskytuje se nejčastěji ve středozemí. Dorůstá výšky (5-) 20 - 25 (i 35)cm. Pod zemí v hloubce 3 - 5cm vytváří kulovitou až úzce hruškovitou hlízku s tmavěhnědou lesklou slupkou o průměru 2cm. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou čárkovité, žlábkovité, rýhované, zpravidla ohnuté a poléhavé. Kvete bílými, růžovými, fialovými nebo žlutými nálevkovitými květy se 6ti korunními lístky a se žlutými tyčinkami a délou 2 - 3cm. Podobá se krokusu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. crocea/Trichonema croceum - Turecko, Sýrie; květy žluté

Vyhovují ji písčité nebo skalnaté půdy, trávníky, úhory, světlé lesy a plné slunce. Přezimuje při teplotách kolem 10°C.

Romulea camerooniana

synonyma: Bulbocodium cameroonianum, R. alpina, R. campanuloides, R. campanuloides var. gigantea, R. thodei, R. thodei subsp. gigantea

Romulea cedarbergensis

Romulea citrina

Romulea clusiana

Romulea collina

Romulea columnae

synonyma: *Bulbocodium columnae*, *Ixia columnae*, *Trichonema columnae*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Turecko, Velká Británie

Dorůstá výšky 5 - 7cm. Cibule má průměr 0,5 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *grandiscapa* - Kanárské ostrovy, Madeira; výška 10 - 40cm; pod zemí vytváří cibulovitou hlízu; listy jsou 4hranné, úzké, žlábkovité; kvete květy po 1 - 4ks se 2ma listeny, vlastní květy jsou 6tičetné, bělavé, žilky tmavěfialové, jícen fialový, ale na bázi žlutý; pastviny a světlé lesy
- subsp. *rollii*

Romulea congoensis

synonyma: *R. keniensis*

Romulea corsica

synonyma: *Bulbocodium corsicum*

oblasti: Korsika

Romulea cruciata

synonyma: *Bulbocodium cruciatum*, *Ixia cruciata*

Romulea cyrenaica

Romulea dichotoma

synonyma: *Bulbocodium dichotomum*, *Gladiolus dichotoma*, *Gladiolus dichotomus*, *R. caplandica*, *R. rosea* var. *dichotoma*, *Trichonema dichotomum*

Romulea discifera

Romulea diversiformis

Romulea eburea

Romulea eburnea

Romulea elliptica

Romulea engleri

Romulea eximia

oblasti: Kapsko

Roste v Kapsku. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 2 - 30cm. Hluboko pod zemí vytváří hlízu. Vytváří 3 - 8 přízemní téměř válcovitých listů délky 25 - 45cm a průměru 1 - 1,5mm se 4 rýhami. Listeny jsou červenohnědé nebo zelenavé s blanitým hnědým okrajem. Vlastní květ má zvonkovitý tvar délky 4 - 5 (i 6)cm, vnitřní strana trubky je žlutá (zřídka zelená), okvětní listky jsou obkopinaté, dlouhé 3,3 - 4cm, barvy červenooranžové, růžové nebo červené s tmavěčervenými skvrnami při bázi. Tyčinky jsou dlouhé 1,5 - 2,2cm. Plodem je tobolka.

Vyhovují ji písčité půdy vlhká v zimě a na jaře, v létě vysychající.

Romulea fibrosa

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 8 - 30cm. Pod zemí vytváří hlízu. Listy jsou přízemní, bývá jich 2 - 6ks. Mají čárkovitý tvar, 4 úzké žlábkы a průměru 0,5 - 1mm. Vnější listeny jsou zelené s blanitým rezavým okrajem. U vnitřních může být okraj i průsvitný. Kvete zvonkovými květy se žlutým hrdlem. Okvětní lístky jsou dlouhé 1,6 - 2,5cm a mají barvu růžovou až na fialovělou a tmavší žilnatinu. Tyčinky jsou dlouhé 0,9 - 1,4cm. Plodem je tobolka.

Romulea fischeri

synonyma: R. linaresii subsp. abyssinica, R. purpurascens var. edulis

Romulea flava

synonyma: Bulbocodium flavum, Ixia flava

Romulea flexuosa

synonyma: R. attenuata

Romulea florentii

Romulea gigantea

Romulea gracillima

Romulea grandiscapa

synonyma: *Bulbocodium grandiscapum*, *R. columnae* subsp. *grandiscapa*, *R. lactea*, *Trichonema grandiscapum*

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Kanárských ostrovů s výjimkou Lanzarote. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Listy jsou přízemní, trávovité. Kvete bílými květy s fialovým středem a žilkováním a průměrem 2 - 4cm. Plodem je tobolka.

Vyhovují ji lesní okraje nebo světliny.

Romulea hallii

Romulea hantamensis

synonyma: *Lapeirousia hantamensis*

Romulea hirsuta

synonyma: *Trichonema hirsutum*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Pod zemí vytváří hlízu zvonkovitého tvaru. Listy vytváří pouze přízemní, obvykle v počtu 2 - 6ks. Mají válcovitý nebo zploštělý tvar s rýhami délky 5 - 30cm a šířky 0,5 - 4mm. Vnější listeny jsou zelinkavé, nemají blanitý okraj. Vnitřní blanku na okraji mají a je bělavý, vzácně nahnědlý. Kvete zvonkovými květy délky (1,5 -) 2 - 4,5cm, hrdlo je žluté, okvětní lístky podlouhé až obkopinaté, dlouhé 1,5 - 3,5cm v barvě oranžové, růžové nebo červené obvykle s tmavými skvrnami při bázi. Tyčinky jsou dlouhé 0,7 - 1,5cm. Plodem je tobolka.

Vyhovují ji písčité vysychavé půda s vlhkem na podzim a na jaře.

Romulea hirta

Romulea jugicola

Romulea kamisensis

Romulea kombergensis

Romulea leipoldtii

Romulea ligistica

synonyma: *Bulbocodium ligisticum*, *R. apollinis*, *R. bulbocodium* f. *purpureascens*, *R. bulbocodium* f. *violacea*, *R. bulbocodium* subsp. *apollinis*, *R. bulbocodium* subsp. *ligistica*, *R. bulbocodium* subsp. *rouyana*, *R. bulbocodium* subsp. *vaccarii*, *R. bulbocodium* var. *umbellata*, *R. ligistica* subsp. *rouyana*, *R. ligistica* var. *rouyana*, *R. linaresii* subsp. *rouyana*, *R. rouyana*, *R. umbellata*, *Trichonema umbellatum*

oblasti: Itálie

Kvete fialovými květy se světlejším středem.

Romulea lilacina

Romulea linaresii

synonyma: *Bulbocodium linaresii*, *Trichonema linaresii*

oblasti: Itálie

Kvete fialovými květy. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *graeca*
- subsp. *linaresii*

Romulea longipes

Romulea lutea

Romulea luteiflora

synonyma: *R. atrandra* var. *luteiflora*

Romulea macowanii

synonyma: *Bulbocodium macowanii*

Romulea maculata

Romulea malaniae

Romulea maroccana

synonyma: *R. bulbocodium* subsp. *maroccana*

oblasti: Maroko

Romulea melitensis

oblasti: Střední středozemí

Patří mezi endemity Malty.

Romulea membranacea

Romulea minutiflora

Romulea monadelpha

synonyma: *Spatialanthus speciosus*, *Trichonema monadelphum*

oblasti: Kapsko

Pochází z Kapska. Pod zemí vytváří hlízu. Kvete červenými zvonkovými květy, které jsou na vnitřní straně u báze černé s bílým lemem.

Romulea montana

synonyma: *R. ambigua* var. *aurantiaca*, *R. hirsuta* var. *aurantiaca*, *R. rosea* var. *flavescens*

Romulea monticola

Romulea multifida

Romulea multisulcata

oblasti: Kapsko

Roste v Kapsku.

Vyhovují ji pravidelně zaplavované mělké tůně.

Romulea namaquensis

synonyma: *R. namaquensis* subsp. *bolusii*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Romulea nivalis

synonyma: *R. bulbocodium* var. *nivalis*, *Trichonema nivale*

oblasti: Izrael

Romulea numidica

synonyma: *Bulbocodium numidicum*, *R. numidica* var. *aurantioviolacea*, *R. rollii* var. *aurantioviolacea*

Romulea obscura

synonyma: *R. similis*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Pod zemí vytváří stonkovou hlízu. Listů je 3 - 6ks, jsou přízmení, nitkovité, jemně rýhované, dlouhé 10 - 50cm a široké 0,5 - 1mm. Vnější listeny jsou zelenavé nebo hnědozelené s úzkým blanitým okrajem. Vnitřní mají široký blanitý okraj průstivtné nebo hnědozelené barvy. Kvete zvonkovými květy délky 1,5 - 5cm. Hrdlo je žluté, okvětní lístky jsou podlouhlé nebo obkopinaté, oražnové až červené, méně častěji žluté a dlouhé 1 - 4cm.

Vyhovuje jí vlhké písčité půdy.

Romulea papyracea

Romulea pearsonii

Romulea penzigii

Romulea petraea

oblasti: Izrael

Romulea phoenicia

oblasti: Izrael

Romulea pratensis

Romulea ramiflora (Romulea větvená)

synonyma: *Bulbocodium ramiflorum*, *Ixia ramiflora*, *Trichonema ramiflorum*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libye, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Tunisko, Turecko

Patří mezi endemity Malty. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Cibule má průměr 0,5 - 1cm.

Romulea requienii

synonyma: *Bulbocodium requienii*, *R. atroviolacea*

oblasti: Itálie, Korsika, Sardínie

Roste v Itálii, Korsice a Sicílii. Kvete tmavěfialovými květy.

Romulea revelieri

synonyma: *Bulbocodium revelieri*, *R. insularis*

oblasti: Itálie

Romulea rosea

synonyma: *Bulbocodium roseum*, *Ixia rosea*, *Syringodea rosea*, *Trichonema roseum*

oblasti: Austrálie, Evropa, Kalifornie, Kapsko, Nový Zéland

Pochází z JAR, ale zdomácněla i v Evropě, Austrálii, Novém Zélandu a Kalifornii. Jedná se o drobnou trvalou rostlinu o výšce (10 -) 15 - 30 (i 40)cm. Pod zemí vytváří hlízky průměru 1cm s tvrdou slupkou. Listy jsou trávovité, přízemní, válcovité, úzce rýhované, dlouhé 36cm a široké 0,5 - 2,5mm a rostlina jich vytváří 3 - 6ks. Kvete růžovými zvonkovými květy se žlutým hrdlem a délou 1,5 - 4,8cm, vnější listeny jsou zelenavé nebo nažloutlé s úzkým blanitým okrajem, vnitřní listeny jej mají širší a hnědavý, korunní lístky jsou podlouhlé nebo obkopinaté, růžové, červenofialové nebo i bílé, dlouhé 1 - 3,8cm a tyčinky mají délku 0,7 - 1,6cm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. *australis*
- var. *rosea*

Romulea rupestris

Romulea sabulosa

oblasti: Kapsko

Pochází z Kapska.

Romulea saldanensis

Romulea sanguinalis

Romulea saxatilis

Romulea schlechteri

synonyma: *R. elegans* var. *parviflora*, *R. hybrida*

Romulea setifolia

Romulea singularis

Romulea sinispinosensis

Romulea sladenii

Romulea speciosa

synonyma: *Bulbocodium speciosum*, *Ixia bulbocodium* var. *speciosa*, *Ixia neglecta*, *R. oliveri*, *Trichonema speciosum*

Romulea sphaerocarpa

Romulea stellata

Romulea subfistulosa

synonyma: *R. vanzyliae*

Romulea sulphurea

Romulea syringodeoflora

Romulea tabularis

synonyma: *R. duthieae*, *R. rosea* var. *parviflora*, *R. versicolor*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste při pobřeží v JAR. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 2 - 30cm. Pod zemí vytváří stonkovou hlízu. Listy jsou přízemní a bývá jich 3 - 5ks. Mají nitkovitý tvar se 4mi žlábky a průměrem 1 - 2mm. Vnější listeny jsou zelenavé nebo načervenalé se zanedbatelným blanitým okrajem. Vnitřní listeny mají blanku širokou s nahnědlými skvrnami nebo okrajem. Kvete zvonkovými květy s podlouhlými okvětními lístky délky 1 - 2,8cm, vnitřní strana je žlutá, v horní části namodralá až bílá. Vnější strana může být hnědě nebo zeleně skvrnitá. Tyčinky jsou dlouhé 0,6 - 1,2cm. Plodem je tobolka.

Vyhovují ji vlhké propustné písčité půdy nebo i vápenité písky.

Romulea tempskyana

Romulea tetragona

Romulea tortilis

Romulea tortuosa

synonyma: *Bulbocodium tortuosum*, *Ixia tortuosa*, *Trichonema tortuosum*

Romulea toximontana

Romulea triflora

synonyma: *Bulbocodium filifolium*, *Bulbocodium subluteum*, *Crocus triflorus*, *Geissorhiza sublutea*, *Ixia crocea*, *Ixia filifolia*, *Ixia sublutea*, *R. filifolia*, *R. schlechteriana*, *R. sublutea*, *Trichonema filifolium*

Romulea tubulosa

Romulea uniflora

oblasti: Kapsko

Pochází z Kapska.

Romulea unifolia

Romulea vaillantii

Romulea variicolor

oblasti: Itálie, Sicílie

Romulea villaretii

Romulea vinacea

Romulea viridibracteata

Romulea vlokii

Romulea x limbarae

Romulea x limbarae

Další informace:

<http://botany.cz/cs/romulea-eximia/>

<https://www.rostliny.net/>