

Moraea sisyrinchium (Kosatcovník badilový)

synonyma: Diaphane edulis, Evansia syrtica, Gynandriris littorea, Gynandriris maricoides, Gynandriris numidica, Gynandriris sisyrinchium, Helixyra sisyrinchium, Iris aegyptia, Iris collina, Iris fugax, Iris involuta, Iris libyca, Iris maricoides, Iris samaritanii, Iris sisyrinchium, Iris sisyrinchium f. alba, Iris sisyrinchium f. caerulea, Iris sisyrinchium f. rosea, Iris sisyrinchium f. violacea, Iris sisyrinchium subsp. fugax, Iris sisyrinchium var. major, Iris sisyrinchium var. marmarica, Iris sisyrinchium var. minor, Iris sisyrinchium var. purpurea, Iris sisyrinchium var. syrtica, Iris syrtica, Iris todaroana, Iris zelantea, Moraea sicula, Moraea tenoreana, Sisyrinchium majus, Xiphion sisyrinchium

čeleď: Iridaceae

oblasti: Afganistán, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Egypt, Irák, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Maroko, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tádžikistán, Tunisko, Turecko

Roste od středozemí po Írán, Afghánistán a Pákistán jako trvalka. Dorůstá výšky 5 - 40 (i 60)cm. Pod zemí má kulovitou vláknitou hlízu o průměru (1-) 1,5 - 3cm. Vytváří 2 čárkovité rýhované pochvaté listy délky 10 - 40 (i 50)cm a šířky 0,5 - 0,8 (i 1)cm. Kvete modrofialovými květy po (1-) 2 - 4 (i 6)ti ks s bílými, žlutými nebo oranžovými skvrnami v úžlabí listenů s krátkou trubkou, vnější korunní lístky jsou dlouhé 2,5 - 3,5cm, jsou mírně ohnuté zpět, mají bílou bázi se žlutými skvrnami, vnitřní lístky jsou užší a vzpřímené. Plodem je tobolka délky 1,5 - 2 (i 4)cm, šířky 5mm a obsahuje eliptická zploštělá hnědě černá semena délky 1,5 - 3mm.

Vyhovují mu suché trávníky, okraje křovin, písčiny a dokáže růst i v zasolených místech.

<https://www.rostliny.net/>